

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
17. Juni 2004 (17.06.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/050871 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C12N 15/10, 15/62, C12Q 1/02, G01N 33/68
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013709
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
4. Dezember 2003 (04.12.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
102 56 669.0 4. Dezember 2002 (04.12.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): UNIVERSITÄTSKLINIKUM CHARITE BERLIN [DE/DE]; Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PASCHKE, Matthias [DE/DE]; Hohenfriedbergstr. 11, 10829 Berlin (DE).
- (74) Anwälte: ZWICKER, Jörk usw.; Boehmert & Boehmert, Pettenkoferstr. 20 - 22, 80336 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MIXTURE OF AT LEAST TWO FUSION PROTEINS, THE PRODUCTION THEREOF AND THE USE OF THE SAME

(54) Bezeichnung: GEMISCH MINDESTENS ZWEIER FUSIONSPROTEINE SOWIE IHRE HERSTELLUNG UND VERWENDUNG



(57) Abstract: The invention relates to a protein mixture containing at least one first fusion protein containing a protein or a protein fragment, an interaction domain, and a protein translocation sequence which causes the fusion protein to be translocated by the cytoplasmic membrane when expressed in a bacterium in an essentially unfolded state, and at least one second fusion protein containing a protein or a protein fragment, an interaction domain, and a protein translocation sequence which causes the fusion protein to be translocated by the cytoplasmic membrane when expressed in a bacterium in an essentially folded state. The interaction domain of the first fusion protein can bind to that of the second fusion protein.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Proteingemisch, enthaltend mindestens ein erstes Fusionsprotein, enthaltend ein Protein oder Proteinfragment, eine Interaktionsdomäne und eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, dass das Fusionsprotein bei Expression in ein Bakterium in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand durch

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

transloziert wird, und mindestens ein zweites Fusionsprotein, enthaltend ein Protein oder Proteinfragment, eine Interaktionsdomäne und eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird, wobei die Interaktionsdomäne des ersten Fusionsproteins an die des zweiten Fusionsproteins binden kann.

### **Gemisch mindestens zweier Fusionsproteine sowie ihre Herstellung und Verwendung**

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Proteingemisch, enthaltend mindestens ein erstes Fusionsprotein, enthaltend ein Protein oder Proteinfragment, eine Interaktionsdomäne und eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in ein Bakterium in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird, und mindestens ein zweites Fusionsprotein, enthaltend ein Protein oder Proteinfragment, eine Interaktionsdomäne und eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird, wobei die Interaktionsdomäne des ersten Fusionsproteins an die des zweiten Fusionsproteins binden kann.

Die Phagendisplay-Technologie wird heutzutage in vielen Bereichen der Biotechnologie zum Auffinden von Proteinen mit gewünschten Bindungseigenschaften und enzymatischen Aktivitäten verwendet (Forrer, P. et al. (1999) Current Opinion in Struct. Biol. 9:514-520 und Gao, C. et al. (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99:12612-12616). Gleichermäßen wird die Technologie verwendet, um beispielsweise die Bindungseigenschaften, die enzymatischen Eigenschaften und/oder die thermodynamische Stabilität von bereits bekannten oder durch die Phagendisplay-Technologie isolierten Proteine zu verbessern (Forrer, P. et al. (1999) siehe oben). Die Grundlage für die Phagendisplay-Technologie liegt in der Beobachtung, daß bestimmte sogenannte nicht-lytische Bakteriophagen Bakterien lediglich infizieren und die Phagenpartikel nicht etwa durch Lyse des Bakteriums freisetzen, sondern die einzelnen Bestandteile des Bakteriophagens durch das Zytoplasma ins Periplasma und letztendlich auf die Bakterienzelloberfläche transportieren, wo dann der komplette Phage assembliert wird, der sich anschließend von der Bakterienzelle löst. Die Fusion eines interessierenden Proteins mit einem Phagenhüllprotein führt daher zum Export dieses Proteins aus dem bakteriellen Zytoplasma und der Präsentation auf der Oberfläche des Bakteriums. Für die Präsentation geeignete Phagenhüllproteine sind beispielsweise die aus dem M13-Phagemid stammenden pIII, pVI, pVII, pVIII und pIX (Gao, C. et al. (2002) siehe oben).

Der N-Terminus des Phagenhüllproteins ist nach außen gerichtet, so daß das fusionierte Protein N-terminal vom Phagenhüllprotein angeordnet sein muß, damit es auf der Phagenoberflä-

che präsentiert wird. Dies führt zu keinem Problem, wenn einzelne bereits bekannte Proteine mit einem der genannten Phagenhüllproteinen fusioniert werden sollen, da für diese Proteine START- und STOP-Codons bekannt sind. Es führt jedoch dann zu Problemen, wenn eine sogenannte Phagen-Bibliothek hergestellt werden soll, bei der die Phagenhüllproteine mit einer cDNA-Bibliothek fusioniert werden sollen. Das Problem liegt darin, daß die in cDNA-Bibliotheken enthaltenden kodierenden Nukleinsäuren in der Regel translationelle STOP-Codons am 3'-Ende enthalten da durch die Poly(A<sup>+</sup>)-Selektion der mRNA und durch das sich anschließende Oligo-(dT)-priming die resultierenden cDNAs immer die translationellen STOP-Codons enthalten. So liegt bei Fusion einer Oligo-(dT)-geprimten cDNA 5' vom Phagenhüllprotein immer ein STOP-Codon zwischen der cDNA und dem Phagenhüllprotein, wodurch wiederum die Expression eines Fusionsproteins aus dem cDNA kodierten Protein und dem Phagenhüllprotein verhindert wird. Daher wurde von Cramer, R. und Suter, M. (1993) *Gene* 137:69-75 ein neuartiges Klonierungs- und Expressionssystem entwickelt, das darauf basiert, daß die Interaktionsdomänen der beiden Oncoproteine cJun und cFos, die über ein Proteinmotiv von gleichmäßig beabstandeten Leuzinresten dem sogenannten „Leuzin-Zipper“ eine starke Wechselwirkung zwischen den beiden Proteinen ausbilden (Landschulz et al. (1988) *Science* 240:1759-64), genutzt werden, um das jeweils separat exprimierte Phagenhüllprotein und das cDNA-kodierte Protein zu einem Heterodimer zu verbinden. Dazu wurde von einem LacZ-Promotor gesteuert, ein Fusionsprotein exprimiert, das am N-Terminus aus cJun und am C-Terminus aus einem Phagenhüllprotein (pIII) bestand und ein zweites Fusionsprotein, das am N-Terminus aus cFos und am C-Terminus aus einer cDNA-Bank bestand, wobei auch dieses Protein durch einen zweiten LacZ-Promotor gesteuert wurde. Durch die Interaktion von cJun und cFos über die jeweiligen Leuzin-Zipper im Periplasma eines Bakteriums wurde dadurch die Präsentation von Protein bzw. Proteinfragmenten, die durch cDNAs kodiert sind auf filamentösen Phagen möglich.

Beim Einsatz der Phagendisplay-Technologie gibt es das weitere Problem, daß die Assemblierung der Phagen und somit auch der Einbau der Fusionsproteine in die Phagenpartikel ausschließlich im Periplasma stattfindet (Russel et al. (1997) *Gene* 192(1):23-32). Um die jeweiligen Fusionsproteine ins Periplasma der Bakterienzelle zu exportieren, muß demnach gegebenenfalls gentechnisch eine Sec-Signalsequenz an das Fusionsprotein angefügt werden. Diese Signalsequenz bewirkt, daß die Fusionsproteine in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand ins Periplasma transportiert werden. Eine beträchtliche Anzahl von Proteinen kann jedoch nicht mittels des Sec-Transportwegs ins Periplasma gelangen, da sogenannte „Stop-

Transfer“-Sequenzen oder eine zu schnelle Faltung des Proteins, die bereits ins Zytoplasma erfolgt, einen Transport verhindern. „Stop-Transfer“-Sequenzen bewirken durch eine lokale Häufung positiv-geladener Aminosäuren in der Proteinsequenz, daß das entsprechende Protein bei der Translokation über den Sec-Transportweg in der inneren Membran stecken bleibt.

5 Proteine, die durch ihre schnelle und/oder stabile Faltung nicht mehr in der entfalteten Form von den Proteinen des Sec-Transportweges – insbesondere von SecB – gebunden werden können, werden nicht zum Sec-Translokase-Komplex transportiert und verbleiben im Cytoplasma (Yamane et al. (1988) J. Bio. Chem. 263:19690-19696 und Berks, B. C. (1996) Mol. Microbiol. 22:393-404 und Bergs, B. C. et al. (2000) Mol. Microbiol. 35:260-274). Proteine,

10 die auf reduzierende Bedingungen oder die für ihre Funktionsfähigkeit auf zytoplasmatische Co-Faktoren, wie beispielsweise FeS-Zentren oder Molybdopterin angewiesen sind, können ebenfalls nicht über den Sec-Transportweg in funktioneller Form ins Periplasma gelangen. Aufgrund der Inkompatibilität mit dem Sec-Transportweg können demnach viele Polypeptide nicht funktionell gefaltet mit dem Phagendisplay präsentiert und anschließend selektiert werden.

15 Die Translokation der Fusionsproteine über den Sec-Transportweg ins Periplasma stellt daher einen wesentlichen Nachteil der im Stand der Technik bekannten Phagendisplay-Techniken dar.

Aus den unterschiedlichen Anforderung an das zelluläre Milieu bei Faltung bestimmter Proteine ergibt sich ein weiteres Problem bei der Expression von Fusionsproteinen insbesondere in

20 Bakterien, wenn der eine Teil des Fusionsproteins nur im Periplasma eine korrekte Faltung annimmt, wie das z.B. bei Antikörperproteinen der Fall ist (Gao, C. et al. (2002) siehe oben) und der andere Teil des Fusionsproteins nur im Zytoplasma korrekt gefaltet werden kann, wie das z.B. beim grün-floreszierenden Protein (GFP) der Fall ist, das Sec-inkompatibel ist. So ist

25 z.B. die Expression von Antikörper-GFP-Fusionsprotein, d.h. von Fluoreszenz-markierten Antikörpermolekülen, in Bakterien bisher nicht möglich. Die Beschränkung auf den Sec-Transportweg verhindert somit die Herstellung einer Vielzahl interessanter Proteinkonjugate insbesondere in Bakterien.

30 Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin die Einschränkung der im Stand der Technik bekannten Phagendisplay-Technologie auszuräumen und die Herstellung von Fusionsproteinen zu ermöglichen, die bei Herstellung durch die im Stand der Technik bekannten Verfahren nicht zu funktionellen Fusionsproteinen führen.

Die vorliegende Erfindung stellt daher in einem Aspekt ein Proteingemisch zur Verfügung, enthaltend: a) mindestens ein erstes Fusionsprotein, enthaltend: i) ein Protein oder Proteinfragment, ii) eine Interaktionsdomäne und iii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird, und b) mindestens ein zweites Fusionsprotein, enthaltend: i) ein Protein oder Proteinfragment, ii) eine Interaktionsdomäne und iii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird, wobei die Interaktionsdomäne des ersten Fusionsproteins an die des zweiten Fusionsproteins binden kann.

Das Protein oder Proteinfragment des ersten Fusionsproteins umfaßt vorzugsweise Proteine, die im ungefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran eines Bakteriums, vorzugsweise eines Gram-negativen Bakteriums transloziert werden können und die demnach nicht für ihre korrekte Faltung auf das reduzierende zytoplasmatische Milieu und/oder auf zytoplasmatische Co-Faktoren angewiesen sind und die auch im Periplasma eine im wesentlichen korrekte Faltung erreichen können. Beispiele solcher Proteine umfassen, sind aber nicht limitiert auf schwere Immunoglobulinketten, leichte Immunoglobulinketten, Fragmente dieser Ketten, sogenannte „Single-Chain-Antikörper“ (Bird, R. E. (1988) Science 242:423-6), Diabodies (Holliger, P. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 90(14):6444-8, Rezeptoren, vorzugsweise extrazelluläre Domänen von Rezeptoren, wie beispielsweise, EGFR, PDGFR oder VEGFR, oder Rezeptorliganden, wie beispielsweise EGF, PDGF oder VEGF, Integrine, vorzugsweise deren extrazelluläre Domänen, Intimine und deren Domänen, wie beispielsweise EaeA, Kohlenhydrat-bindende Proteine und Domänen davon, wie MBP und CBD, Albumin-bindende Proteine und Domänen oder Protein A und dessen Domänen.

Das Protein oder Proteinfragment des zweiten Fusionsproteins kann ein beliebiges Protein oder Proteinfragment sein, bevorzugt sind jedoch Proteinfragmente, die ihre Faltung und/oder ihre Funktion nur dann erhalten, wenn sie sich bereits im Zytoplasma eines Bakteriums falten und daher in einen im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran in das Periplasma transloziert werden. Beispiele solcher Proteine sind autofluoreszierende Proteine, wie beispielsweise GFP oder Varianten davon mit veränderten Absorptionsmaxima, Enzyme, wie beispielsweise  $\beta$ -Lactamase, Cofaktor-abhängige Proteine, wie beispielsweise

TMAO-Reduktase und Meerrettich-Peroxidase, Proteine, die von einer cDNA kodiert werden, welche aus einer cDNA-Bibliothek stammt, oder synthetische Proteine.

5 In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Protein oder Proteinfragment des ersten Fusionsproteins und die Proteintranslokationssequenz ein Phagenhüllprotein oder ein periplasmatisches Markerenzym, wie PhoA, ein Intimin ein Protein der äußeren Bakterienmembran oder ein periplasmatisches Rezeptorprotein, insbesondere ein Kohlenhydrat-bindendes Protein. Bevorzugte Phagenhüllproteine, die in einem Proteingemisch der vorliegenden Erfindung  
10 enthalten sein können, sind ausgewählt aus den M13-Phagemid Hüllproteinen pIII, pVI, pVII, pVIII und pIX. Von diesen Phagenhüllproteinen sind jedoch nur pIII und pVIII mit einer bekannten Sec-abhängigen Proteintranslokationssequenz versehen, wobei die in den restlichen Phagenhüllproteinen enthaltenden Proteintranslokationssequenzen noch nicht identifiziert worden sind. Da diese Phagenhüllprotein dennoch in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand in das Periplasma des Bakteriums transportiert werden, werden solche Proteine im  
15 Sinne der Erfindung auch ohne Identifikation der Proteintranslokationssequenz als Proteine angesehen, die aus einem Protein oder Proteinfragment und einer Proteintranslokationssequenzen bestehen.

20 Die Interaktionsdomänen, die in dem ersten und zweiten Fusionsprotein verwendet werden, führen zur Bindung des ersten Fusionsproteins an das zweite Fusionsprotein. Bevorzugt sind hierbei Interaktionsdomänen, die zu einer relativ festen Interaktion der beiden Proteine führen, wobei eine relativ feste Interaktion eine Interaktion ist, die auch im oxidativen Milieu des Periplasmas, auf der Bakterienzelloberfläche oder bei der Sezernierung des Heterodimers oder Heteromultimers auch außerhalb der Zelle bestehen bleibt. Geeignete Interaktionsdomänen  
25 des ersten und zweiten Fusionsproteins, die erfindungsgemäß in den Fusionsproteinen enthalten sein können, sind beispielsweise eine Leuzin-Zipper-Domäne und eine Leuzin-Zipper-Domäne, wie sie zuerst in den zwei Oncoproteinen cJun und cFos beschrieben wurden (Landschulz et al. (1988) siehe oben) Varianten davon aus anderen Hetero- oder Homodimeren sowie artifizielle Leuzin-Zipper-Domänen oder eine Helix-Loop-Helix-Domäne und eine  
30 Helix-Loop-Helix-Domäne (Moor et al. (1989) Cell 56:777-783), ein Calmodulin und ein Calmodulin-bindendes Peptid (Montigiani, S. et al. (1996) JMB 258:6-13) oder jeweils ein Peptid eines Peptid-Dimers. Der Begriff Interaktionsdomänen umfaßt auch Domänen die eine Multimerisierung von mehr als zwei Fusionsproteinen erlauben.

Die Proteintranslokationssequenz des ersten Fusionsproteins bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium, vorzugsweise in einem Gram-negativen Bakterium in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran in das Periplasma transloziert wird. Der Fachmann ist ohne weiteres in der Lage, entsprechende Proteintranslokationssequenzen aufzufinden, wobei er sich des folgenden Experiments bedienen kann. Eine potentielle als Proteintranslokationssequenz geeignete Proteinsequenz, die zur Translokation eines damit fusionierten Proteins in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand führt, wird mit einem ein GFP-myc-TAG enthaltenden Protein fusioniert. Wenn die potentielle Proteintranslokationssequenz nicht zur Proteintranslokation ins Periplasma führt, wird das GFP-Protein im Zytoplasma des Bakteriums gebildet, was sich über die zytoplasmatische Fluoreszenz nachweisen läßt, es gelangt dann jedoch nicht an die Oberfläche oder ins Medium, so daß der Myc-TAG durch einen anti-Myc-Antikörper bspw. den monoklonalen Antikörper 9E10 weder im Medium noch auf der Oberfläche nachweisbar ist. Führt die Sequenz jedoch zur Translokation des Fusionsproteins ins Periplasma und schließlich zur Präsentation auf der Oberfläche bzw. zur Sezernierung in die Umgebung des Bakteriums, so läßt sich das präsentierte bzw. sezernierte GFP-myc-TAG-Fusionsprotein durch einen Anti-myc-Antikörper im Medium und/oder auf der Oberfläche des Bakteriums nachweisen. Gleichzeitig sollte im Periplasma in diesem Fall keine Fluoreszenz beobachtet werden können, da bei Translokation des GFPs ins Periplasma in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand sich das Protein dort nicht mehr korrekt faltet (sogenannte „Sec-Inkompatibilität“). Die Proteintranslokationssequenzen die bevorzugt im ersten Fusionsprotein verwendet werden sind solche, die in dem Sec-abhängigen Transportweg (Danese, P. N. und Silhavy, T. J. (1998) *Annu. Rev. Genet.* 32:59-94), die in dem SRP-abhängigen Transportweg (Meyer, D. I. et al. (1982) *Nature* 297:647-650) oder die in einem YidC-abhängigen Transportweg erkannt werden (Samuelson, J. C. et al. (2000) *Nature* 406:637-641). Allerdings kann es sich auch um eine Transportweg-unabhängige Sequenz handeln. Besonders geeignete Proteintranslokationssequenzen sind daher beispielsweise Signalsequenzen des PhoA, PelB, OmpA und pIII.

Als weiterer Bestandteil enthält das zweite Fusionsprotein eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium, vorzugsweise in einem Gram-negativen Bakterium, in einem im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird. Eine Proteintranslokationssequenz mit dieser Eigenschaft liegt dann vor, wenn ein Protein, beispielsweise GFP, das nur im Zytoplasma des Bakteriums seine funktionelle Konformation einnehmen kann, ohne Verlust der Autofluores-



5 zenz ins Periplasma transportiert wird. Diese Eigenschaft der erfindungsgemäßen Prote-  
intranslokationssequenz läßt sich mit dem vorangehend im Hinblick auf die erste Prote-  
intranslokationssequenz beschriebenen Experiment, untersuchen. Mit einem ähnlichen Expe-  
riment wurde bereits ein Konsensusmotiv für das Tat-spezifische Führungspeptid des Twin-  
10 Arginine-Translokation-(Tat)-Transportwegs von Bakterien und Pflanzenchloroplasten ermit-  
telt. Der im Stand der Technik bekannte Tat-Transportweg erlaubt den Transport von bereits  
im Zytoplasma gefalteten Proteinen ins Periplasma und kann somit Proteine, die mit dem Sec-  
Transportweg inkompatibel sind, ins Periplasma transportieren. Genau wie der Transport über  
den Sec-Transportweg, wird auch der Tat-Transportweg durch eine spezielle Gruppe von  
15 Führungssequenzen vermittelt (DeLisa, M. P. et al. (2002) J. Biol. Chem. 277:29825-29831).  
Ein weiterer im Stand der Technik bekannter Transportweg, der den Transport von Proteinen  
in im wesentlichen gefalteten Zustand erlaubt, ist der über Thylakoid-Membranen (Settles, A.  
M. und Martienssen, R. (1998) Transcell Biol. 8:494-501). Daher enthält das zweite Fusions-  
protein in einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eine Signalse-  
20 quenz, die von einem Tat-abhängigen Transportweg oder von einem Thylakoid-Aph-  
abhängigen Transportweg erkannt wird und dadurch zur Translokation des Fusionsproteins in  
im wesentlichen gefalteten Zustand führt. Ein Konsensusmotiv einer Proteintranslokationsse-  
quenz, das von einem Tat-abhängigen Transportweg erkannt wird, ist in DeLisa, M. P. et al.  
((2002) siehe oben) beschrieben worden. Die Sequenz lautet: S/T/RRXFLK.

20 In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Proteingemisches sind min-  
destens ein erstes und mindestens ein zweites Fusionsprotein aneinander kovalent oder nicht-  
kovalent gebunden. Zur Erreichung einer kovalenten Bindung der zwei getrennt exprimierten  
Fusionsproteine können beispielsweise in dem Protein zusätzlich nahe der Interaktionsdomä-  
25 ne Cysteinreste oder Homologe davon angeordnet werden, die im oxidativen Milieu des Pe-  
riplasmas eine kovalente Bindung zwischen den beiden Fusionsproteinen herstellen. Eine ko-  
valente Bindung kann jedoch beispielsweise auch durch die Inkorporation von Aminosäuren  
mit Foto-aktivierbaren Gruppen in die beiden Fusionsproteine und anschließende UV-  
Exposition der zunächst lediglich nicht-kovalent aneinander gebundenen Protein erreicht  
30 werden. Dem Fachmann sind weitere Verfahren bekannt, um zwei zunächst allein durch  
nicht-kovalente Bindung verbundene Proteine miteinander zu verbinden. Zu diesem dem  
Fachmann bekannten Verfahren der kovalenten Verbindung zweier nicht-kovalent-  
gebundener Fusionsproteine zählt beispielsweise das Psoralen-Crosslinking.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Nukleinsäuregemisch, das für ein erfindungsgemäßes Proteingemisch kodiert. Eine kodierende Nukleinsäure, im Sinne der Erfindung ist ein Nukleinsäuresequenz, die für ein erfindungsgemäßes Polypeptid oder einen Vorläufer davon kodiert. Bevorzugterweise handelt es sich bei dem Nukleinsäuregemisch um  
5 DNA oder RNA, vorzugsweise um eine DNA, wobei die DNA einzelsträngig oder doppelsträngig vorliegen kann. Die jeweils für das erste oder zweite Fusionsprotein kodierende Nukleinsäure enthält des weiteren Promotoren, die die Expression des jeweiligen Fusionsproteins in der Wirtszelle ermöglichen. Geeignete Promotoren für die Expression in beispielsweise *E. coli* sind der *trp*-Promotor, *lacZ*-Promotor, *tet*-Promotor, T7-Promotor oder *ara*-  
10 Promotor. Weitere Elemente, die in den jeweiligen, das Nukleinsäuregemisch ausmachenden Nukleinsäuren vorhanden sein können, sind Replikationsursprünge (Ori), selektive Markergene, die beispielsweise Ampizilin- oder Chloramphenikolresistenz vermitteln. Die Nukleinsäuren können neben dem für das jeweilige Fusionsprotein kodierenden Bereich, die üblicherweise in bakteriellen Expressionsvektoren verwendeten Elemente aufweisen. Dem Fachmann  
15 sind eine Vielzahl solcher Elemente sowie Vektoren bekannt, wie beispielsweise pGEM oder pUC.

In einer bevorzugten Ausführungsformen des Nukleinsäuregemisches der vorliegenden Erfindung, sind die zwei Nukleinsäuren, die für das erste und zweite Fusionsprotein kodieren, kovalent miteinander verbunden, vorzugsweise über Phosphordiester-Bindungen. Insbesondere  
20 sind die Nukleinsäuremoleküle, die für das erste und zweite Fusionsprotein kodieren und geeignete regulatorische Elemente enthalten, auf einem Plasmid enthalten, so daß die erfindungsgemäßen Proteingemische bereits durch Transfektion nur eines Plasmids bzw. wenn diese Nukleinsäure in einem Phagen enthalten ist, durch Infektion mit nur einem Phagen beispielsweise in einem Bakterium hergestellt werden können. In einer bevorzugten Ausführungsform werden beide Fusionsprotein unter der Kontrolle nur eines Promotors als bicistronische Kasette exprimiert.  
25

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Vektor, enthaltend ein erfindungsgemäßes Proteingemisch und/oder enthaltend ein erfindungsgemäßes Nukleinsäuregemisch. Ein Vektor, im Sinne der vorliegenden Erfindung, ist ein Protein-Nukleinsäuregemisch, das in der Lage ist, die in ihm enthaltenen Proteingemische und/oder Nukleinsäuregemisch in eine Zelle einzuführen. Dabei ist es bevorzugt, daß dabei die von den Nukleinsäuregemischen kodierten Fusionsproteine in der Zelle zur Expression kommen und  
30

somit de *novo* synthetisierte Fusionsproteine aus der Zelle gewonnen, bzw. auf der Zelloberfläche präsentiert werden. Geeignete Vektoren sind beispielsweise nicht-lytische Phagen, wie M13-Phage, fd-Phage, F1-Phage und lytische Phagen, wie  $\lambda$ -Phage.

- 5 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung, ist eine Zelle, enthaltend ein erfindungsgemäßes Proteingemisch, ein erfindungsgemäßes Nukleinsäuregemisch und/oder einen erfindungsgemäßen Vektor. Erfindungsgemäße Zellen können prokaryontische oder eukaryontische Zellen sein. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, handelt es sich bei den erfindungsgemäßen Zellen um prokaryontische Zellen, insbesondere  
10 um Bakterien und noch bevorzugter um *E. coli* (TG1, XL-1, JM83, BL21) oder *B. subtilis*.

- Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Bibliothek, enthaltend mindestens zwei erfindungsgemäße Proteingemische, mindestens zwei erfindungsgemäße Vektoren und/oder mindestens zwei erfindungsgemäße Zellen, wobei die Proteine oder Proteinfragmente  
15 der jeweiligen ersten oder jeweiligen zweiten Fusionsproteine voneinander unterschiedlich sind. Eine solche Bibliothek kann entweder gezielt ausgewählte unterschiedliche bekannte Proteine oder Proteinfragmente enthalten oder die Interaktionsdomäne und die Proteintranslokationssequenz des ersten oder zweiten bevorzugt des zweiten Fusionsproteins können mit einer cDNA-Bibliothek fusioniert werden, wobei bei Expression dieser Nukleinsäuren eine  
20 Vielzahl unterschiedlicher erster oder zweiter Fusionsproteine entstehen, die jeweils unterschiedliche Proteine oder Proteinfragmente enthalten. Vorzugsweise wird dabei der cDNA-Anteil am C-Terminus des Fusionsproteins exprimiert, um dadurch das vorangehend geschilderte Problem bei N-terminaler Fusion einer cDNA zu umgehen. In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die Bibliothek eine Vielzahl von erfindungsgemäßen Zellen, wobei jede  
25 Zelle ein anderes Proteingemisch herstellt, vorzugsweise auf ihrer Oberfläche präsentiert. Im Falle, daß das Protein oder Proteinfragment und die Interaktionsdomäne des ersten Proteins ein Phagenhüllprotein ist, erlaubt die erfindungsgemäße Bibliothek die Präsentation einer Vielzahl von Proteinen oder Proteinfragmenten, die im zweiten Fusionsprotein enthalten sind. Dabei ist die Präsentation nicht wie bei den im Stand der Technik bekannten Phagendisplay-Bibliotheken auf Proteine oder Proteinfragmente beschränkt, die sich im Periplasma der Zelle  
30 zu ihrer funktionellen Form falten, sondern umfaßt auch Proteine, die nur im Zytoplasma ihre funktionelle Faltung erlangen können.

Die erfindungsgemäßen Proteingemische, die Heterodimere oder Multimere bilden können, wobei die Bestandteile der Heterodimere oder Multimere in mindestens zwei unterschiedlichen zellulären Kompartments ihre dreidimensionale Struktur erhalten haben, lassen sich nunmehr in einer Reihe von Verfahren unter anderem auch im Phagendisplay einsetzen.

5

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zum Auffinden von Substanzen, die an ein Proteingemisch, einen erfindungsgemäßen Vektor oder an eine erfindungsgemäße Zelle binden, enthaltend die Schritte:

- 10 a) In-Kontaktbringen mindestens einer potentiell-bindenden Substanz mit einem erfindungsgemäßen Proteingemisch, einem erfindungsgemäßen Vektor oder einer erfindungsgemäßen Zelle und
- b) Messen der Bindung der Substanz an das Proteingemisch, den Vektor und/oder die Zelle.

15 Das Verfahren dient somit vorzugsweise dem Auffinden einer Substanz oder von Substanzen, die an ein bereits bekanntes Proteintarget binden, beispielsweise um Inhibitoren, Aktivatoren, Kompetitoren oder Modulatoren des bekannten Proteintargets aufzufinden. Die potentiell bindenden Substanzen deren Bindung an ein erfindungsgemäßes Proteingemisch, einen erfindungsgemäßen Vektor und/oder eine erfindungsgemäße Zelle gemessen werden soll, kann

20 jede beliebige chemische Substanz oder jedes beliebige Substanzgemisch sein. Beispielsweise kann es sich hierbei um Substanzen einer Peptid-Bibliothek handeln, um Substanzen aus einer kombinatorischen chemischen Bibliothek, um Zellextrakte, insbesondere Pflanzenzellextrakte, und um Proteine oder Proteinfragmente.

25 Unter In-Kontaktbringen der potentiell bindenden Substanz(en) mit einem erfindungsgemäßen Proteingemisch, Vektor oder Zelle wird jede Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen den beiden Komponenten verstanden, wobei sich die beiden Komponenten jeweils unabhängig voneinander in flüssiger Phase, beispielsweise in Lösung oder in einer Suspension, befinden können oder auch an eine feste Phase, beispielsweise in Form einer im wesentlichen planaren Oberfläche oder in Form von Partikeln, Perlen oder ähnlichem, gebunden sein können.

30 In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine Vielzahl unterschiedlicher potentiell bindender Substanzen an einer festen Oberfläche immobilisiert und wird mit den erfindungsgemäßen Proteingemisch, dem erfindungsgemäßen Vektor oder der erfindungsgemäßen Zelle In-Kontakt gebracht und anschließend wird die Bindung der erfindungsgemäßen Substanzen an

den verschiedenen Positionen, an denen jeweils unterschiedliche potentiell-bindende Substanzen immobilisiert sind, gemessen.

Das Messen der Bindung des erfindungsgemäßen Proteingemisches, des Vektors oder der Zelle, an eine potentiell bindende Substanz kann beispielsweise über die Messung eines mit dem erfindungsgemäßen Proteingemisch, mit dem erfindungsgemäßen Vektor oder der erfindungsgemäßen Zelle verbundenen Markers geschehen, wobei geeignete Marker dem Fachmann bekannt sind und beispielsweise Fluoreszenz- oder radioaktive Marker umfassen. In einer bevorzugten Ausführungsform enthält das Proteingemisch, der Vektor oder die Zelle zusätzlich im zweiten Fusionsprotein neben dem Protein oder Proteinfragment, dessen Wechselwirkung mit den potentiell-bindenden Substanzen untersucht werden soll, ein autofluorezierendes Protein, wie beispielsweise GFP oder Varianten davon. Das Messen der Bindung der Substanz kann jedoch auch über die Änderung von elektrochemischen, insbesondere Redoxeigenschaften beispielsweise der immobilisierten potentiell bindenden Substanzen nach In-Kontaktbringen gemessen werden. Geeignete Verfahren umfassen beispielsweise potentiometrische Methoden. Weitere Verfahren zum Nachweis der Bindung zweier Moleküle oder Molekulgemische, sind dem Fachmann bekannt und können gleichermaßen zum Messen der Bindung der potentiell-bindenden Substanz an das erfindungsgemäße Proteingemisch, den erfindungsgemäßen Vektor oder die erfindungsgemäße Zelle verwendet werden.

Gegebenenfalls können vor, zwischen oder nach den Schritten des erfindungsgemäßen Verfahrens weitere Schritte eingeführt werden, wie beispielsweise das ein- oder mehrmalige Waschen nach dem In-Kontaktbringen, um beispielsweise unspezifische Bindungen zwischen der potentiell bindenden Substanz und dem erfindungsgemäßen Proteingemisch, dem erfindungsgemäßen Vektor oder der erfindungsgemäßen Zelle zu lösen.

Als weitere Schritte nach dem Messen der Bindung der Substanz kann eine bindende Substanz z.B. auf Grund der gemessenen Bindungsstärke ausgewählt werden und dann direkt bspw. zur Inhibition des bekannten Proteintargets verwendet werden. Die bindende Substanz kann jedoch auch durch im Stand der Technik bekannte Verfahren, die auch Verfahren der kombinatorischen Chemie umfassen modifiziert werden. Beispielsweise durch das Anfügen von Halogensseitengruppen, vorzugsweise F oder Cl, durch das Anfügen von niedrigen Alkylgruppen, wie Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, n-Butyl-, iso-Butyl- oder tert-Butylgruppen oder durch das Anfügen von Amino-, Nitro-, Hydroxyl-, Amido- oder Carbon-

säuregruppen. Die so unterschiedlich modifizierten bindenden Substanzen können dann erneut in dem erfindungsgemäßen Verfahren auf ihre Bindung getestet werden und hinsichtlich der gewünschten Bindungsspezifität und dem dadurch erzielten Effekt (beispielsweise Aktivierung, Inhibierung oder Modulation der jeweiligen Aktivität) optimiert werden.

5

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Auffinden von Proteinen oder Proteinfragmenten, die an eine Testsubstanz binden, enthaltend die Schritte:

- a) In-Kontaktbringen mindestens einer Testsubstanz mit einer erfindungsgemäßen Bibliothek und
- 10 b) Messen der jeweiligen Bindung der Testsubstanz an die unterschiedlichen Proteingemische, Vektoren und/oder Zellen der erfindungsgemäßen Bibliothek.

Bei diesem Verfahren sollen Proteine oder Proteinfragmente ausgewählt werden, die an eine gegebene Testsubstanz binden. Vorzugsweise handelt es sich dabei um die Proteine oder Proteinfragmente des zweiten Fusionsproteins, da diese mit einer größeren Wahrscheinlichkeit korrekt gefaltet sind, als die Proteine oder Proteinfragmente des ersten Fusionsproteins, die nur dann korrekt gefaltet sind, wenn die jeweiligen Proteine auch im oxidativen Mileu des Periplasmas ihre native Konformation annehmen können. Eine Testsubstanz im Sinne der vorliegenden Erfindung kann jede beliebige chemische Substanz oder ein Gemisch davon  
15 sein. Vorzugsweise handelt es sich dabei jedoch um ein Protein oder Proteinfragment, insbesondere um einen Rezeptor, einen Rezeptorliganden, einen Transkriptionsfaktor, einen Ionenkanal, ein Molekül der Signaltransduktionskaskade, Struktur- und Speicherprotein, Toxin oder Lichtrezeptor- und Pigmentprotein. Das Messen der jeweiligen Bindung der unterschiedlichen Proteingemische, Vektoren und/oder Zellen der Bibliothek an die Testsubstanz kann  
20 wie vorangehend beschrieben, über markierungsabhängige oder markierungsunabhängige Meßverfahren erfolgen.

In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens enthält das Verfahren die weiteren Schritte: Auswählen mindestens eines Proteingemisches, eines Vektors  
30 oder einer Zelle aufgrund der gemessenen Bindung und Herstellen einer zweiten Bibliothek, wobei die Bibliothek durch Modifikation des im ausgewählten Proteingemisch, im ausgewählten Vektor oder in der ausgewählten Zelle enthaltenen Proteins oder Proteinfragments erzeugt wird. Der Auswahlprozeß von Proteingemischen, Vektoren oder Zellen aus der Bibliothek wird vorzugsweise aufgrund der Stärke der Bindung durchgeführt, wobei die Protein-

gemische, Vektoren oder Zellen bevorzugt sind, die die stärkste Bindung an die jeweilige Testsubstanz zeigen. Ausgehend von der Aminosäuresequenz des im ausgewählten Proteingemisch, Vektor oder Zelle enthaltenen Proteins oder Proteinfragments, die durch Standardverfahren bestimmt werden kann, können Modifikation erzeugt werden, die jeweils zu geringen Änderungen der Aminosäuresequenz führen und damit zu einer Vielzahl von Derivaten, die im Vergleich zum Ausgangsprotein bzw. Proteinfragment eine leicht veränderte dreidimensionale Struktur besitzen. Solche Modifikationen lassen sich durch im Stand der Technik bekannte Verfahren beispielsweise durch Zufallsmutagenese oder auch durch gezielte Substitution einzelner Nukleinsäurecodons, der für das Protein oder Proteinfragment kodierenden Nukleinsäure, erhalten. Bevorzugt sind dabei Substitution, die sogenannte „konservative“ Substitutionen sind. Eine konservative Substitution liegt dann vor, wenn beispielsweise ein für eine basische Aminosäure kodierendes Nukleinsäurecodon durch ein anderes für eine basische Aminosäure kodierendes Nukleinsäurecodon, ein für eine saure Aminosäure kodierendes Nukleinsäurecodon durch ein anderes für eine saure Aminosäure kodierendes Nukleinsäurecodon bzw. ein für eine polare Aminosäure kodierendes Nukleinsäurecodon durch ein anderes für eine polare Aminosäure kodierendes Nukleinsäurecodon ersetzt wird.

Die auf Grundlage der ausgewählten Proteingemische, Vektoren oder Zellen neu erzeugten zweiten Bibliotheken können nunmehr in einem weiteren Schritt wiederum mit der Testsubstanz in Kontakt gebracht werden, worauf in einem weiteren Schritt die jeweilige Bindung der Testsubstanz an die modifizierten Proteingemische, Vektoren oder Zellen der zweiten Bibliothek gemessen werden kann. Gegebenenfalls können nunmehr die Schritte des Auswählens mindestens eines Proteingemisches, eines Vektors oder einer Zelle aufgrund der gemessenen Bindung und die sich daran anschließend Herstellung einer dritten bzw. n-ten Bibliothek sowie das Inkontaktbringen und Messen der jeweiligen Bindung der Testsubstanz an die unterschiedlichen Proteingemische, Vektoren oder Zellen der dritten bzw. n-ten Bibliothek, ein bis n-mal wiederholt werden bis ein Proteingemisch, ein Vektor oder eine Zelle ausgewählt worden ist, das, der bzw. die die gewünschte Bindung zeigt.

Das zuvor geschilderte Verfahren wird auch als gerichtete Evolution bezeichnet, da in einer Vielzahl von Schritten die aus Modifikation und Selektion bestehen, Proteine oder Proteinfragmente „evolutionär“ hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft, insbesondere ihrer Bindungseigenschaft weiterentwickelt werden.

Die durch das obige Verfahren aufgefundenen oder zusätzlich hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft optimierten Proteine oder Proteinfragmente können, wenn sie beispielsweise auf die Aktivierung oder Repression eines bestimmten zellulären Signalwegs hin optimiert worden sind, als Wirkstoff in einem Medikament eingesetzt werden. Dasselbe gilt für die bindenden Substanzen, die in dem Verfahren zum Auffinden von potentiell bindenden Substanzen identifiziert worden sind. Daher umfassen die erfindungsgemäßen Verfahren in einer bevorzugten Ausführungsform den weiteren Schritt, daß die ausgewählte bindende Substanz oder das in dem ausgewählten Proteingemisch, in dem ausgewählten Vektor oder in der ausgewählten Zelle enthaltene Protein oder Proteinfragment oder eine Variante davon mit einem pharmazeutisch akzeptablem Träger und/oder Hilfsstoff gemischt wird.

Eine „Variante“ des Proteins oder Proteinfragments beinhaltet Modifikation des N- oder C-Terminus oder Modifikation von Aminosäureseitenketten, die beispielsweise die Stabilität, Löslichkeit oder Biokompatibilität des Proteins oder Proteinfragments erhöhen. Umfaßt sind jedoch auch Fusionsproteine mit den erfindungsgemäß identifizierten Proteinen oder Proteinfragmenten, die als weitere Komponenten beispielsweise autofluoreszente Marker, wie beispielsweise GFP oder Zytostatika wie beispielsweise Choleratoxin enthalten können.

Pharmazeutisch akzeptable Träger und/oder Hilfsstoffe umfassen Substanzen, die die bindende Substanz bzw. das Protein oder Proteinfragment oder seine Varianten stabilisieren, deren pharmazeutische Verträglichkeit erhöhen oder die für die jeweilige Applikationsform, wie beispielsweise Tablette, Pflaster oder Infusionslösung, erforderlich sind, wie beispielsweise Konservierungsmittel, Puffer, Salz oder Proteaseinhibitoren.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Kit zur Herstellung eines Nukleinsäuregemisches nach Anspruch 10 enthaltend:

- a) mindestens eine erste Nukleinsäure enthaltend mindestens eine Restriktionsschnittstelle 5' und/oder 3' von einer Nukleinsäure kodierend für ein erstes Fusionsprotein enthaltend:
  - i) eine Interaktionsdomäne und
  - ii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das erste Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird.



Dieses Kit erlaubt die Insertion einer ausgewählten Nukleinsäuresequenz 5' oder 3' von der Nukleinsäure, die für eine Interaktionsdomäne und eine Proteintranslokationssequenz kodiert, so daß im Ergebnis von der resultierenden Nukleinsäure ein Fusionsprotein kodiert wird, das am C-Terminus und/oder am N-Terminus ein durch die jeweils eingeführte Nukleinsäuresequenz kodiertes Protein oder Proteinfragment enthält. Vorzugsweise handelt es sich bei der eingeführten DNA um eine cDNA-Bibliothek, wobei diese besonders bevorzugt unter Verwendung der 3'-Restriktionsschnittstelle in die Nukleinsäure eingeführt wird. In einer bevorzugten Ausführungsform enthält das Kit den Leuzin-Zipper aus dem cFos-Protein und in einer weiteren Bevorzugten Ausführungsform die Tat-abhängige Proteintranslokationssequenz To-  
10 rA.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kits enthält das Kit des weiteren mindestens eine zweite Nukleinsäure enthaltend mindestens eine Restriktionsschnittstelle 5' und/oder 3' von einer Nukleinsäure kodierend für ein zweites Fusionsprotein enthaltend:

- 15 i) eine Interaktionsdomäne und  
ii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das zweite Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird, wobei die Interaktionsdomäne des ersten Fusionsproteins an die des zweiten Fusionsproteins binden kann.

20 Diese Nukleinsäure erlaubt die Insertion 5' oder 3' von der für eine Interaktionsdomäne und eine Proteintranslokationssequenz kodierenden Nukleinsäure, so daß im Ergebnis von der resultierenden Nukleinsäure ein Fusionsprotein kodiert wird, das am N- oder C-Terminus ein von der insertierten Nukleinsäure kodiertes Protein oder Proteinfragment umfaßt. Beispielsweise können Nukleinsäuren, die für Phagenhüllproteine kodieren in die Nukleinsäure inseriert werden, wobei diese vorzugsweise in die 3'-Restriktionsschnittstelle eingeführt werden.

Es hat sich gezeigt, daß wenn in die zweite Nukleinsäure Nukleinsäuren eingeführt werden, die für Phagenhüllproteine kodieren, daß die resultierenden Fusionsproteine bei starker Expression von beispielsweise dem gIIIp-Fusionsprotein zu einer hohen Toxizität für *E. coli*-Zellen führen. Aus diesem Grund wird bei klassischen Phagendisplaysystemen ein Amber-Codon 5' von dem gIII-Protein eingefügt. In Supressorstämmen (z.B. XL-1 Blue) wird dadurch die Expression des gIIIp-Fusionsproteins um ca. 90% reduziert. Darüber hinaus ermöglicht das Amber-Codon (das in Nicht-Suppressorstämmen als STOP-Codon gelesen wird)

sehr einfach die lösliche Expression des zuvor mit dem Phagenprotein fusionierten und auf dem Phagen präsentierten Proteins, indem das Phagemid in einen Nicht-Suppressorstamm (z.B. BL21) eingebracht und dort die Expression durchgeführt wird. Daher enthält die erste und/oder die zweite Nukleinsäure in einer bevorzugten Ausführungsform entweder 5 oder 3' ein Amber-Codon. Vorzugsweise ist das Amber-Codon in der ersten Nukleinsäure 5' angeordnet und in der zweiten Nukleinsäure 3' angeordnet. Dadurch läßt sich in einem geeigneten bakteriellen Wirt erreichen, daß ausschließlich das in der ersten Nukleinsäure 5' eingefügte Protein oder Proteinfragment exprimiert wird und gleichzeitig der toxische Effekt des in der zweiten Nukleinsäure 3' eingefügten gIIIp verhindert wird.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kits ist die Interaktionsdomäne des zweiten Fusionsproteins die Leuzin-Zipperdomäne des cJun-Proteins. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthält die Nukleinsäure eine Nukleinsäure, die für eine Sec-abhängige Proteintranslokationssequenz insbesondere das PelB-Führungspeptid kodiert.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung einer Zelle zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Proteingemisches sowie die Verwendung eines erfindungsgemäßen Proteingemisches, eines erfindungsgemäßen Vektors oder einer erfindungsgemäßen Zelle zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Bibliothek.

Ein bevorzugtes Anwendungsgebiete der erfindungsgemäßen Proteingemische, erfindungsgemäßen Phagen, der erfindungsgemäßen Zellen, insbesondere der erfindungsgemäßen Bibliotheken, enthaltend vorgenannte Proteingemische, Phagen und Zellen sowie der erfindungsgemäßen Kits, ist die Präsentation von Proteinen auf filamentösen Phagen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Proteinen, die aufgrund ihrer Inkompatibilität mit dem Sec-Transportweg nicht mit Hilfe der klassischen Phagendisplay-Technologie präsentiert werden können. Als besonders bevorzugte Anwendungsbereiche ergeben sich daher die Präsentation und Selektion von cDNA-Expressionsbibliotheken und die Präsentation und Selektion von DNA-Bibliotheken zur gerichteten Evolution von Proteinen, auch „protein engineering“ genannt.

Eine weitere bevorzugte Verwendung liegt in der Herstellung von Proteinkonjugaten. Dabei ist die Verwendung dann besonders bevorzugt, wenn das Protein oder Proteinfragment des

ersten Fusionsproteins und das Protein oder Proteinfragment des zweiten Fusionsproteins jeweils unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der zur korrekten Faltung erforderlichen zellulären Umgebung haben. So erlaubt es die vorliegende Erfindung Antikörper direkt mit Markerproteinen gentechnisch zu fusionieren, die bei Produktion in Bakterien und Transport über den Sec-abhängigen Transportweg nicht korrekt gefaltet würden und daher bei Anwendung von Standardverfahren nicht als Markerprotein zur Markierung des Antikörper verwendet werden können. Markerproteine-Antikörperfusion, deren funktionelle Expression erst durch die vorliegende Erfindung möglich geworden ist, umfassen beispielsweise Fusionen aus autofloreszierenden Proteine, wie GFP und schweren Immunoglobulinketten, leichten Immunoglobulinketten oder „single-chain-antibodies“.

Die folgenden Abbildungen und Beispiele dienen lediglich der Illustration der Erfindung und sind nicht als Beschränkung derselben auf die konkret in den Beispielen angegebenen Ausführungsformen zu verstehen. Alle im Text enthaltenen Zitate werden hierdurch in ihrem gesamten Umfang durch Verweis aufgenommen.

### Abbildungen

- Abb. 1      Konsensussequenzen Tat-abhängiger, Sec-abhängiger, SRP-abhängiger oder YidC-abhängiger Signalsequenzen, wobei X eine beliebige Aminosäure und # eine hydrophobe Aminosäure präsentieren.
- Abb. 2      Tat-abhängiges TorA-Signalpeptid, wobei X eine beliebige Aminosäure und # eine hydrophobe Aminosäure präsentieren
- Abb. 3      Prinzip des TLF-Systems, wobei CT die Domäne des pIII, pelB die Sec-Signalsequenz, TSS die Tat-Signalsequenz und POI das präsentierte Protein bedeuten.
- Abb. 4      Restriktionskarte des Plasmids pCD4/GFP24, dessen Nukleinsäuresequenz als SEQ ID NR: 1 im Anhang wiedergegeben ist.
- Abb. 5      Restriktionskarte des Plasmids pCA1/GFP24, dessen Nukleinsäuresequenz in SEQ ID NR: 2 wiedergegeben ist.

Abb. 6 Restriktionskarte des Plasmids pCN1/GFP24, dessen Nukleinsäuresequenz in SEQ ID NR: 3 wiedergegeben ist.

5 Abb. 7 Kompetitiver Phagen-ELISA, wobei weiße Balken die Ergebnisse mit GFP24-präsentierende Phagen zeigen. GFP24-Phagen wurden mit Hilfe von XL-1 Blue Zelle hergestellt, die das Plasmid pCD4/GFP24 tragen. Graue Balken präsentieren die Ergebnisse, die mit  $\beta$ -Lactamase-tragenden Phagen erzielt wurden.  $\beta$ -Lactamase-präsentierende Phagen wurden in XL-1 Blue Zelle hergestellt, die das Plasmid pCD4/BLA tragen.

10 Abb. 8 Enzymatischer Assay, der Präsentation von  $\beta$ -Lactamase auf Bakteriophage, wobei weißen Kreise die Ergebnisse mit GFP24-tragende Phagen zeigen. GFP24-Phagen wurden mit Hilfe von XL-1 Blue Zelle hergestellt wurden, die das Plasmid pCD4/GFP24 tragen. Schwarze Vierecke präsentieren die Ergebnisse die mit  $\beta$ -Lactamase-tragenden Phagen erzielt wurden.  $\beta$ -Lactamase-präsentierende Phagen wurden in XL-1 Blue Zelle hergestellt, die das Plasmid pCD4/BLA tragen. Gezeigt wird die Absorption bei 486 nm in Abhängigkeit von der Zeit.

20

## Beispiele

### Beispiel 1: Verwendete Vektoren

25

pCD4/GFP24 ist ein Cysteindisplay-Phagemid, das auf dem pGP-Vektor (Paschke M., et al.: (2001) Biotechniques 30: 720-725) beruht.

30

pCA1/GFP24 ist ein Cysteindisplay-Phagemid, das auf pGP-F100 basiert. Es kann für die  $tet^{o-p}$ -kontrollierte Expression von Protein als Fusion von cFos-Leuzin-Zipper verwendet werden. Die Translokation des cFos-Fusionsproteins im periplasmatischen Raum wird durch die TorA-Führungspeptidsequenz (Tat-abhängige Translokationsweg) vermittelt. Das  $tet^{o-p}$ -kontrollierte Transkript enthält ein zweites Cistron, von dem das c-jun::G3Ps-Fusionsprotein exprimiert wird. Das c-Jun::G3Ps wird über den Sec-abhängigen Translokationsweg in dem

periplasmatischen Raum gesteuert. Kovalente Komplexe zwischen dem cFos-Fusionsprotein und dem cJun::G3PS-Fusionsprotein werden im periplasmatischen Raum aufgrund der Dimerisierung von cJun und cFos und anschließender Ausbildung von Cysteinbindungen zwischen den Proteinen hergestellt. Das Phagemid enthält eine GFP24-Kassette, flankiert von SfiI-Restriktionsstellen an den Positionen 148 und 910 und ist zwischen dem TorA-Führungspeptid und cFos angeordnet. Diese Kassette muß durch das zu präsentierende Protein ersetzt werden.

pCA1/GFP24 ist ein von pCD4 abgeleitetes Cysteindisplay-Phagemid, das auf dem pGP-Vektor basiert. pCD4/GFP24 ist ein Cysteindisplay-Phagnid, das auf dem pGP-Vektor (Paschke M., et al.: (2001) *Biotechniques* 30: 720-725) beruht. Es kann für die tet<sup>o-p</sup>-kontrollierte Expression von Proteinen als Fusion mit dem cFos-Leucinzipper verwendet werden. Die Translokation des cFos-Fusionsproteins in den periplasmatischen Raum wird durch das TorA-Führungspeptid (Tat-Transportweg) vermittelt. Das tet<sup>o-p</sup>-kontrollierte Transkript enthält ein zweites Cistron, von dem das c-jun::G3Pss Fusionsprotein exprimiert wird (G3Pss umfaßt Aminosäuren 252 bis 406 des reifen gIII-Proteins des fd-Phagen). Das c-jun::G3Pss wird durch einen Sec-abhängigen Transportweg (pelB-Führungspeptid) in dem periplasmatischen Raum gelenkt. Kovalente Komplexe von cFos-Fusionsprotein und c-jun::G3Pss werden aufgrund der Dimerisierung zwischen cJun und cFos im periplasmatischen Raum und die anschließende Ausbildung von Cysteinbindung zwischen den Proteinen gebildet (Crameri, R. und Suter M. (1993), siehe oben). Der Phagendisplay der Proteine, die mit cFos fusioniert sind, kann durch sogenannten Helferphagenrescue erreicht werden. Im Gegensatz zu pGP überträgt das Phagemid pCD4-GFP24 Chloramphenicolresistenz. Das Resistenzgen (CAT) und der tet-Repressor (TetR) werden unter Kontrolle des  $\beta$ -Lactamasepromotors von einer bicistronischen Kassette kontrolliert. Das Transkript wird in einem  $\lambda$ -Phagenterminator terminiert. Die Tat-TetR-Kassette ist in umgekehrter Orientierung zu der cFos- und cJun-Fusionskassette. Eine GFP24-Kassette, flankiert an der Position 148 und 910 von SfiI-Restriktionsstellen ist zwischen dem TorA-Führungspeptid und cFos angeordnet. Diese Kassette wird durch das zu präsentierenden Protein ersetzt.

pCD4/Bla ist ein von pCD4/GFP24 abgeleitetes Cysteindisplay-Phagemid, bei dem mittels Restriktion mit SfiI das GFP24 Fragment durch die Sequenz der reifen TEM1  $\beta$ -Lactamase ersetzt wurde. Die eingefügte Lactamaseklonierungskassette mit 5' und 3'-terminalen SfiI-Restriktionsstellen ist in SEQ ID NR: 4 wiedergegeben.

### Beispiel 2: Herstellung von Bakteriophagen

5 Mit dem entsprechenden Phagemid transformierte XLI-Blue-Zellen wurden in 2 TY-Selektionsmedium bei 30°C bis zu einem OD<sub>600nm</sub> von 0,5 kultiviert und dann mit dem Helferphagen VCSM13 mit einem  $Moi = 10-20$  gemischt. Die infizierte Kultur wurde für 30 Minuten bei 37°C kultiviert und anschließend mit Kanamizin in einer Endkonzentration von 60 µg/ml versetzt. Die Kultur wurde für 10 Minuten bei 25°C kultiviert. Durch Zentrifugation (4000 x g, 4°C, 5 Minuten) wurden die Zellen geerntet und anschließend in 2 TY-  
10 Selektionsmedium enthaltend 60 µg/l Kanamizin und 0,5 µg/ml Tetracyclin resuspendiert. Diese Kultur wurde für 5 h bei 25°C kultiviert. Anschließend folgte die Phagenpräparation aus dem Zellkulturüberstand wie folgt: Jeweils 40-50 ml Zellen und Zelltrümmer wurden durch Zentrifugation (4°C, 10.000 rpm in einem A8-24-Rotor für 15 Minuten) vom phagenhaltigen Zellkulturüberstand getrennt. Der Überstand wurde durch einen 0,45 µm Filter fil-  
15 triert und mit ¼ Volumen PEG-NaCl-Lösung (20% w/v PEG 8000, 50% w/v NaCl) gemischt und über Nacht oder für mindestens eine Stunde auf Eis inkubiert. Die Mischung wurde dann bei 4°C für 15 min bei 15.000 rpm in einem A8.24-Rotor zentrifugiert. Der Niederschlag wurde in 2,5 ml eiskaltem PBS resuspendiert und auf 2 ml Plastikröhrchen verteilt. Dann wurde der Überstand mit ¼ Volumen PEG-NaCl-Lösung gemischt und für mindestens eine  
20 weitere Stunde auf Eis inkubiert. Anschließend wurde der Überstand bei 4°C und 14.000 rpm für 15 Minuten zentrifugiert. Der Phagenniederschlag wurde in 0,5-1 ml PBS gelöst. Gegebenenfalls wurde die Phagenlösung durch einen 0,45 µm-Filter filtriert und anschließend bei 4°C gelagert. Bei längerer Lagerung wurde die Phagenlösung mit 1 Volumen Glycerol versetzt und bei -70°C gelagert.

25

Der Phagentiter wurde durch Standardverfahren unter Verwendung einer Verdünnungsreihe bestimmt. Der Titer lag üblicherweise zwischen  $10^{12}$  und  $10^{13}$  cfu/ml.

### Beispiel 3: Präsentation von funktionellem GFP24 auf Phagen

30

GFP24 ist eine zirkulärpermutierte Variante des grün fluoreszierenden Proteins, die zusätzlich ein Epitop des P24-Proteins aus HIV enthält (Höhne, W.E. et al. (1993) Mol Immunol 30:1213-21). GFP24 wird durch den anti-P24-Antikörper CB4-1 (Dr. Scholz, Institut für Biochemie, (Universitätsklinikum Charite)) mit hoher Affinität gebunden. GFP24 kann wie auch

GFP selbst nicht über den Sec-Transportweg exportiert werden. Ein funktionelles GFP24 Protein sollte daher bei Expression des oben geschriebenen pCD4/GFP24-Plasmids nur dann zur Präsentation eines funktionsfähigen GFP24 führen, wenn dieser Teil des Proteins nicht durch einen Sec-abhängigen Transportweg, sondern durch einen Tat-abhängigen Transportweg in das Periplasma transportiert worden ist. Um GFP24 auf filamentösen Phagen nachzuweisen, wurde ein Phagen-ELISA wie folgt durchgeführt. Mikrotiterplatten wurden mit 10 µm/ml anit-P24Antikörper-C4-1 beschichtet, dreimal mit PBS/Tween 0,1% gewaschen und mit 200 µl pro Vertiefung Genosys-Blockierungsreagenz (Sigma-Genosys Ltd, Cambridge, UK)) für ein bis zwei Stunden bei Raumtemperatur unter Schütteln inkubiert. Anschließend wurde die Mikrotiterplatte dreimal mit PBS/Tween 20 0,1% gewaschen. Anschließend wurden 50 µl pro Vertiefung GFP24 präsentierende Phagen mit und ohne P24-Peptid in die Mikrotiterplatte gegeben und anschließend die Gegenwart des Phagen in der Mikrotiterplatte mit einem Meerrettichperoxidase gekoppelten anti-Phagen-Antikörper (Seramun Diagnostica GmbH, Dolgenbrodt, Germany)) nachgewiesen. Die Signalstärke entsprach dabei dem an CB4-1 gebundenen Phagen. pCD4/GFP24 Phagen wurden dabei vollständig von CB4-1 durch das P24-Peptid verdrängt, während  $\beta$ -Lactamase präsentierende Phagen (pCD4/BLA), die als Kontrolle verwendet wurden, nicht an CB4-1 gebunden wurden. Darüber hinaus konnte keine unspezifische Bindung an anderer Antikörper oder das Blockierungsreagenz beobachtet werden (s. Abb. 7).

#### Beispiel 4: Präsentation von TEM-1- $\beta$ -Lactamase auf filamentösen Phagen

TEM-1- $\beta$ -Lactamase ist ein periplasmatisches Protein, das durch die Hydrolyse des Lactamrings des Antibiotikums Ampicillin Resistenz gegen Ampicillin vermitteln kann. TEM- $\beta$ -Lactamase wird normalerweise mittels des Sec-abhängigen Transportsystems ins Periplasma exportiert. Zum Nachweis, daß TEM-1- $\beta$ -Lactamase auch durch den Tat-abhängigen Transportweg exportiert werden kann, wurde die Sec-Signalsequenz entfernt und durch die TorA-Sequenz ersetzt. Die erfolgreiche Präsentation von TEM-1- $\beta$ -Lactamase wurde mit dem nachfolgend beschriebenen Enzymassay nachgewiesen, dessen Ergebnis in Abb. 8 dargestellt ist. 800 µl PBS pH 7,4 wurden mit 100 µl Nitrocefin-Stammlösung (500 µg/ml) gemischt und auf 25°C temperiert. 100 µl Phagenlösung wurden hinzugegeben. Die Extinktionsänderung bei 486 nm wurde photometrisch über 10 min. beobachtet. Die Absorptionsänderung bei 486 nm entspricht dabei der  $\beta$ -Lactamaseaktivität der Phagen. Während pCD4/GFP24-Phagen

keine  $\beta$ -Lactamaseaktivität zeigten, war bei pCD4/BLA eine starke  $\beta$ -Lactamaseaktivität zu beobachten.

5 Die Nitrocefinstammlösung wurde folgendermaßen hergestellt: 1 mg Nitrocefin wurde in 100  $\mu$ l DMSO gelöst. Diese Lösung wurde dann mit 1,9 ml PBS pH 7,4 gemischt. Die Lösung wurde für maximal zwei Wochen bei  $-20^{\circ}\text{C}$  gelagert.



## Anprüche

### 1. Proteingemisch enthaltend:

#### a) mindestens ein erstes Fusionsprotein enthaltend:

- i) ein Protein oder Proteinfragment,
- ii) eine Interaktionsdomäne und
- iii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird,

und

#### b) mindestens ein zweites Fusionsprotein enthaltend:

- i) ein Protein oder Proteinfragment,
- ii) eine Interaktionsdomäne und
- iii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird,

wobei die Interaktionsdomäne des ersten Fusionsproteins an die des zweiten Fusionsproteins binden kann.

### 2. Proteingemisch nach Anspruch 1, wobei das Protein oder Proteinfragment des ersten Fusionsproteins eine schwere Immunoglobulinkette, eine leichte Immunoglobulinkette, ein single-chain Antikörper, ein Diabody, ein Rezeptor, ein Rezeptorligand, ein Integrin, ein Intimin, ein Kohlenhydrat-bindendes Protein, ein Albumin-bindendes Protein oder Protein A ist.

3. Proteingemisch nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Protein oder Proteinfragment des zweiten Fusionsproteins ein autofluoreszierendes Protein, insbesondere GFP oder eine Variante davon, ein Enzym, ein Cofaktor-abhängiges Protein, ein Protein, das von einer aus einer cDNA-Bibliothek stammenden cDNA kodiert wird, oder ein synthetisches Protein ist.  
5
4. Proteingemisch nach Anspruch 1, wobei das Protein oder Proteinfragment des ersten Fusionsproteins und die Proteintranslokationssequenz ein Phagenhüllprotein, ein periplasmatisches Markerenzym, ein Intimin, ein Protein der äußeren Bakterienmembran oder ein periplasmatisches Rezeptorprotein ist.  
10
5. Proteingemisch nach Anspruch 4, wobei das Phagenhüllprotein ausgewählt ist aus den M13-Phagenhüllproteinen pIII, pVI, pVII, pVIII und pIX.
- 15 6. Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Interaktionsdomänen des ersten und zweiten Fusionsproteins jeweils eine Leuzin-Zipper-Domäne und eine Leuzin-Zipper-Domäne, eine Helix-Loop-Helix-Domäne und eine Helix-Loop-Helix-Domäne, ein Calmodulin und ein Calmodulin-bindendes Peptid oder ein Peptid-Dimer-Paar natürlichen oder synthetischen Ursprungs sind.  
20
7. Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Proteintranslokationssequenz des ersten Fusionsproteins eine Sec-abhängige, SRP-abhängige, YidC-abhängige Sequenz oder eine Transportweg-unabhängige Sequenz, die in die Membran integriert wird, ist.  
25
8. Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Proteintranslokationssequenz des zweiten Fusionsproteins eine Tat-abhängige oder Thylakoid- $\Delta$ pH-abhängige Sequenz ist.
- 30 9. Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das erste Fusionsprotein an das zweite Fusionsprotein kovalent oder nicht-kovalent gebunden ist.
10. Nukleinsäuregemisch kodierend für ein Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

11. Nukleinsäuregemisch nach Anspruch 10, wobei mindestens zwei Nukleinsäuren, die für unterschiedliche Fusionsproteine kodieren, kovalent miteinander verbunden sind.
- 5 12. Vektor enthaltend ein Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und/oder ein Nukleinsäuregemisch nach einem der Ansprüche 10 oder 11.
- 10 13. Zelle enthaltend ein Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 9, ein Nukleinsäuregemisch nach einem der Ansprüche 10 oder 11 und/oder einen Vektor nach Anspruch 12.
- 15 14. Bibliothek enthaltend mindestens zwei Proteingemische nach einem der Ansprüche 1 bis 9, mindestens zwei Vektoren nach Anspruch 12 und/oder mindestens zwei Zellen nach Anspruch 13, wobei die Proteine oder Proteinfragmente der jeweiligen ersten oder jeweiligen zweiten Fusionsproteine voneinander unterschiedlich sind.
- 20 15. Verfahren zum Auffinden von Substanzen, die an ein Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 9, an einen Vektor nach Anspruch 12 oder an eine Zelle nach Anspruch 13 binden, enthaltend die Schritte:
- 25 a) In-Kontaktbringen mindestens einer potentiell bindenden Substanz mit einem Proteingemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 9, einem Vektor nach Anspruch 12 und/oder einer Zelle nach Anspruch 13 und
- b) Messen der Bindung der potentiell bindenden Substanz an das Proteingemisch, den Vektor und/oder die Zelle.
- 30 16. Verfahren zum Auffinden von Proteinen oder Proteinfragmenten, die an eine Testsubstanz binden, enthaltend die Schritte:
- a) In-Kontaktbringen mindestens einer Testsubstanz mit einer Bibliothek nach Anspruch 14 und

- b) Messen der jeweiligen Bindung der Testsubstanz an die unterschiedlichen Proteingemische, Vektoren und/oder Zellen der Bibliothek.

17. Verfahren nach Anspruch 16 enthaltend die weiteren Schritte:

5

- a) Auswählen mindestens eines Proteingemisches, eines Vektors oder einer Zelle auf Grund der gemessenen Bindung und

10

- b) Herstellen einer zweiten Bibliothek, wobei die Bibliothek durch Modifikation des im ausgewählten Proteingemisch, im ausgewählten Vektor oder in der ausgewählten Zelle enthaltenden Proteins oder Proteinfragments erzeugt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 16 enthaltend die weiteren Schritte:

15

- a) Auswählen mindestens eines Proteingemisches, eines Vektors oder einer Zelle auf Grund der gemessenen Bindung,

20

- b) Herstellen einer zweiten Bibliothek, wobei die Bibliothek durch Modifikation des im ausgewählten Proteingemisch, im ausgewählten Vektor oder in der ausgewählten Zelle enthaltenden Proteins oder Proteinfragments erzeugt wird,

25

- c) In-Kontaktbringen mindestens einer Testsubstanz mit der zweiten Bibliothek,
- d) Messen der jeweiligen Bindung der Testsubstanz an die unterschiedlichen Proteingemische, Vektoren oder Zellen der zweiten Bibliothek und
- e) gegebenenfalls Wiederholen der Schritte a) bis d) bis ein Proteingemisch, ein Vektor oder eine Zelle ausgewählt wird, das, der bzw. die die gewünschte Bindung zeigt.

30

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, wobei in einem weiteren Schritt die bindende Substanz oder das in dem ausgewählten Proteingemisch, in dem ausgewählten Vektor oder in der ausgewählten Zelle enthaltende Protein oder Proteinfragment oder

eine Variante davon mit einem pharmazeutisch akzeptablen Träger und/oder Hilfsstoff gemischt wird.

20. Kit zur Herstellung eines Nukleinsäuregemisches nach Anspruch 10 enthaltend:

5

a) mindestens eine erste Nukleinsäure enthaltend mindestens eine Restriktionsschnittstelle 5' und/oder 3' von einer Nukleinsäure kodierend für ein erstes Fusionsprotein enthaltend:

10

i) eine Interaktionsdomäne und

ii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das erste Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen gefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird.

15 21. Kit nach Anspruch 20, desweiteren enthaltend:

a) mindestens eine zweite Nukleinsäure enthaltend mindestens eine Restriktionsschnittstelle 5' und/oder 3' von einer Nukleinsäure kodierend für ein zweites Fusionsprotein enthaltend:

20

i) eine Interaktionsdomäne und

ii) eine Proteintranslokationssequenz, die bewirkt, daß das zweite Fusionsprotein bei Expression in einem Bakterium in einem im wesentlichen ungefalteten Zustand durch die zytoplasmatische Membran transloziert wird,

25

wobei die Interaktionsdomäne des ersten Fusionsproteins an die des zweiten Fusionsproteins binden kann.

22. Verwendung einer Zelle nach Anspruch 13 zur Herstellung eines Proteingemisches nach einem der Ansprüche 1-9.

30

23. Verwendung eines Proteingemisches nach einem der Ansprüche 1 bis 9, eines Vektors nach Anspruch 12 und/oder einer Zelle nach Anspruch 13 zur Herstellung einer Bibliothek nach Anspruch 14.

Abb. 1



**Tat-abhängige Signalsequenz****Sec-, YidC- und SRP-abhängige Signalsequenz**

Abb. 2

M N N N D L F Q A R R R F A Q L G G L T  
 ATGAACA ATAACGATCT CTTTCAGGCA TCACGTCTCTGGC ACAACTCGGC  
 TACTTGT TATTGCTAGA GAAAGTCCGT AGTGCAGACGACCG TGTTGAGCCG

~~~~~~ R R X # # ~~~~~~  
 ⊕ geladener N-terminus RRX# Konsensusmotiv zentrale hydrophobe

V A G M L G P S L L T R R A T A  
 GTGCGGGGAT GCTGGGGCTGATTGTAA CGCCGCGACG  
 CACGCGCCTA CGACCCCGGC AGTAACAATCGCTGC

~~~~~~ A X A ~~~~~~  
 zentrale hydrophobe Führungspeptidase  
 Erkennungssequenz

Abb. 3






Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7





Abb. 8



## SEQUENZPROTOKOLL

<110> Universitätsklinikum Charité  
 <120> Gemisch mindestens zweier Fusionsproteine sowie ihre Herstellung und Verwendung  
 <130> U30038  
 <150> DE 10256669.0  
 <151> 2002-12-04  
 <160> 4  
 <170> Word 98, Windows  
 <210> 1  
 <211> 4765  
 <212> DNA  
 <213> künstliche Sequenz  
 <220>  
 <221> pCD4/GFP24 Klonierungs- und Expressionsvektor  
 <400> 1

```

ctagataaga aggaagaaaa ataatgaaca ataacgatct ctttcaggca tcacgtcggc 60
gttttctggc acaactcggc ggcttaaccg tcgccgggat gctggggccg tcattgttaa 120
cgccgcgacg tgcgactgcg gccagccgg ccattggcggg atccgttcaa ctacgagacc 180
attatcaaca aaatactcca attggcgatg gccctgtcct tttaccagac aaccattacc 240
tgtcgacaca atctgccctt tcgaaagatc ccaacgaaaa gcgtgaccac atggtccttc 300
ttgagtttgt aactgctgct gggatttccg gtggtggtgg tgctaccccg caggacctga 360
acaccatgct ggggtggtgg ggtagtaaag gagaagaact tttcactgga gttgtcccaa 420
ttcttgttga attagatggt gatgttaatg ggcacaaatt ttctgtcagt ggagagggtg 480
aaggtgatgc aacatacggg aaacttacc ttaaatttat ttgcactact ggaaaactac 540
ctgttccatg gccaacactt gtcactactt tctcttatgg tgttcaatgc ttttcccgtt 600
atccggatca tatgaaacgg catgactttt tcaagagtgc catgcccgaa ggttatgtac 660
aggaacgcac tatatctttc aaagatgacg ggaactacaa gacgcgtgct gaagtcaagt 720
ttgaagggtg tacccttggt aatcgatatc agttaaaagg tattgatttt aaagaagatg 780
gaaacattct cggacacaaa ctcgagtaca actataactc acacaatgta tacatcacgg 840
cagacaaaca aaagaatgga atcaaagcta acttcaaaat tcgccacaac attgaagatt 900
cggcctcggg ggccgcagaa caaaaactca tctcagaaga gaatctgtat ttccaggcgg 960
atgcttgccg tggcaccgac accctgcaag ctgaaaccga ccagctggaa gacgagaaat 1020
ccgctctgca gactgaaatc gctaacctgc tgaaagagaa agagaaactg gaattcatto 1080
tggctgctca cggcggttgt gggctagggt aataacttaa gccaaggagg aaaataaaat 1140
gaaataccta ttgctacgg cagccgctgg attgttatta ctccggccac agccggccat 1200
ggcaagcatc tgcggtggcc gtatcgctcg tctggaagaa aaagttaaaa ccctgaaagc 1260
tcagaactcc gaactggctt ccacogctaa catgctgctg gaacagggtg ctcagctgaa 1320
gcagaaagtt atgaaccacg gcggttgtgg tggcggttcc ctacggggt cgggttccgg 1380
tgattttgat tatgaaaaaa tggcaaacgc taataagggg gctatgaccg aaaatgccga 1440
tgaaaaacgc ctacagtctg acgctaaagg caaacttgat tctgtcgcta ctgattacgg 1500
tgctgctatc gatggtttca ttggtgacgt ttccggcctt gctaattggt atggtgctac 1560
tgggtgattt gctggctcta attcccaaat ggctcaagtc ggtgacgggt ataattcacc 1620
ttaatgaat aatttccgtc aatatttacc ttctttgcct cagtcggttg aatgtcgccc 1680
ttatgtcttt ggcgctggt aaccatatga atttttotatt gattgtgaca aaataaactt 1740
attccgtggt gtcttttgcgt ttcttttata tgttgccacc tttatgtatg tattttcgac 1800
gtttgctaac atactgcgta ataaggagtc ttaataagct tgacctgtga agtgaaaaat 1860
ggcgacatt gtgcgacatt ttttttgtct gccgtttacc gctactgctg cacggatctc 1920
cacgcgcct gtagcggcgc attaagcgcg gcgggtgtgg tggttacgcg cagcgtgacc 1980
gotacacttg ccagcgcct agcgcgcgt cctttcgctt tcttcccttc ctttctcgcc 2040
acgttcgcgg gctttccccc tcaagctcta aatcgggggc tccctttagg gttccgattt 2100
agtgttttac ggcacctcga ccccaaaaaa cttgattagg gtgatggttc acgtagtggg 2160
ccatgcgcct gatagacggt ttttcgccct ttgacgttgg agtccacgtt ctttaatagt 2220

```

```

ggactcttgt tccaaactgg aacaacactc aaccctatct cgggtctattc ttttgattta 2280
taaggggattt tgccgatttc ggcctattgg ttaaaaaatg agctgattta acaaaaaattt 2340
aacgcgcgatg ctaacaaaaat attaaaaaac gcccggcggc aaccgagcgt taatagttaa 2400
gttaccatca cggaaaaagg ttatgctgct ttaagaccc actttcacat ttaagttggt 2460
tttctaattcc gcatatgatc aattcaaggc cgaataagaa ggctggctct gcaccttgg 2520
gatcaaataa ttcgatagct tgtcgtaata atggcgcat actatcagta gtagggtgtt 2580
ccctttcttc tttagcgact tgatgctctt gatcttccaa tacgcaacct aaagtaaaa 2640
gccccactgc gctgagtgc tataatgcat tctctagtga aaaaccttgt tggcataaaa 2700
aggctaattg attttcgaga gtttcatact gtttttctgt aggcogtgta cctaaatgta 2760
cttttgctcc atcgcgatga cttagttaaag cacatctaaa acttttagcg ttattacgta 2820
aaaaatcttg ccagctttcc ctttctaaag ggcaaaagt agtatggtgc ctatctaaca 2880
tctcaatggc taaggcgctg agcaaagccc gcttattttt tacatgccaa tacaatgtag 2940
gctgctctac acctagcttc tggcgagtt tacgggtgt taaaccttcg attccgacct 3000
cattaagcag ctctaattgc ctgttaatca ctttactttt atctaaacga gacatcatta 3060
attcctatta cgcgcgcgcc tgccactcat cgcagtactg ttgtaattca ttaagcattc 3120
tgccgacatg gaagccatca caaacggcat gatgaacctg aatcgccagc ggcatcagca 3180
ccttgctgcc ttgctataa tatttgccca tagtgaaaac gggggcgagg aagttgtcca 3240
tattggccac gtttaaatca aaactgggtga aactcaccca gggattggct gagacgaaaa 3300
acataattctc aataaacctt ttagggaaat aggcaggtt ttcaccgtaa cagccacat 3360
cttgcaata tatgtgtaga aactgcgga aatcgctctg gtattcactc cagagcgatg 3420
aaaacgtttc agtttgctca tggaaaacgg tgtaacaagg gtgaacacta tcccatatca 3480
ccagctcacc gtctttcatt gccatacggg attccggatg agcattcatc agggcgga 3540
gaatgtgaat aaaggccgga taaaacttgt gcttattttt ctttacggtc tttaaaaagg 3600
ccgtaatatc cagctgaacg gtctggttat aggtacattg agcaactgac tgaaatgcct 3660
caaatgttc tttacgatgc cattgggata tatcaacggt ggtatatcca gtgatttttt 3720
tctccatact ctctctttt caatattatt gaagcattta tcagggttat tgtctcatga 3780
gcggatacat atttgaatgt atttagaaaa ataaacaaat aggggttccg cgcacatttc 3840
cccgaagaat gccacctgaa attgtaagcg ttactagtgt ttaacgtgag ttttcgttcc 3900
cctttttgat aatctcatga ccaaaatccc ttagagatct ttttttctgc gcgtaatctg 4020
agaccccgta gaaaagatca aaggatcttc agcggtggtt tggttgccgg atcaagagct 4080
ctgcttgcaa acaaaaaaac caccgctacc cagcagagcg cagataccaa atactgtcct 4140
accaactctt tttccgaagg taactggctt caagaactct gtagcaccgc ctacataacc 4200
tctagtgtag ccgtagttag gccaccactt tgccagtggc gataagtcgt gtcttaccgg 4260
cgctctgcta atcctgttac cagtggctgc ggcgcagcgg tcgggtgaa cgggggggtt 4320
gttgactca agacgatagt taccggataa ctacaccgaa ctgagatacc tacagcgtga 4380
gtgcacacag cccagcttgg agcgaacgac tccccgaagg gagaaaggcg gacaggtatc cggtaagcgg 4440
gctatgagaa agcgccacgc acaggagagc gcacgagggg gcttcagggg ggaaacgcct ggatcttta 4500
tagtcctgtc ggggttcgcc acctctgact tgagcgtcga tttttgtgat gctcgtcagg 4560
ggggcggagc ctatggaaaa acgccagcaa cgcggccttt ttaagggttc tggccttttg 4620
ctggcctttt gctcacatga cccgacacca tccaatggcc agatgattaa ttccataatt 4680
ttgttgacac tctatcattg atagagttaa tttaccactc cctatcagt atagagaaaa 4740
gtgaaatgaa tagttcgaca aaaat

```

<210> 2  
 <211> 4971  
 <212> DNA  
 <213> künstliche Sequenz

<220>  
 <221> pCA1/GFP24 Klonierungs- und Expressionsvektor

```

<400> 2
ctagataaga aggaagaaaa ataatgaaca ataacgatct ctttcaggca tcacgtcggc 60
gtttttctggc acaactcggc ggcttaaccg tcgcccggat gctggggccg tcattgttaa 120
cgccgcgacg tgcgactgcg gccagccgg atccggtcaa ctagcagacc 180
attatcaaca aaataactcca attggcgatg gccctgtcct ttaccagac aaccattacc 240
tgtcgacaca atctgccctt tcgaaagatc ccaacgaaaa gcgtgaccac atggtccttc 300
ttgagtttgt aactgctgct gggatttccg gtggtggtgg tgctaccccg caggacctga 360
acaccatgct ggggtggtgg ggtagttaaag gagaagaact tttcactgga gttgtcccaa 420
ttcttggtga attagatggg gatgttaatg ggcacaaatt ttctgtcagt ggagaggggtg 480
aaggatgatg aacatacggg aaacttacc ttaaatttat ttgcactact ggaaaactac 540

```

|             |             |             |             |             |             |      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| ctgttccatg  | gccaacactt  | gtcactactt  | tctcttatgg  | tggttcaatgc | ttttcccgtt  | 600  |
| atccggatca  | tatgaaacgg  | catgaacttt  | tcaagagtgc  | catgcccga   | ggttatgtac  | 660  |
| aggaacgcac  | tatatctttc  | aaagatgacg  | ggaactacaa  | gacgcgtgct  | gaagtcaagt  | 720  |
| ttgaaggtga  | tacccttggt  | aatcgtatcg  | agttaaaagg  | tattgatttt  | aaagaagatg  | 780  |
| gaaacattct  | cggacacaaa  | ctcgagtaca  | actataactc  | acacaatgta  | tacatcacgg  | 840  |
| cagacaaaca  | aaagaatgga  | atcaaagcta  | acttcaaaat  | tcgccacaa   | attgaagatt  | 900  |
| cggcctcggg  | ggccgcagaa  | caaaaactca  | tctcagaaga  | gaatctgtat  | ttccaggggc  | 960  |
| ggcccaaac   | ttccaccccg  | cctgggttctt | caggcgccgt  | cgggtggcctg | accgacaccc  | 1020 |
| tgcaagctga  | aaccgaccag  | ctggaagacg  | agaaatccgc  | tctgcagact  | gaaatcgcta  | 1080 |
| acctgctgaa  | agagaaagag  | aaactggaat  | tcattctggc  | tgctcacggc  | ggttgttaat  | 1140 |
| aaactaagc   | aaggaggaaa  | ataaaatgaa  | atacctattg  | cctacggcag  | ccgctggatt  | 1200 |
| gttattactc  | gctgcccac   | cagcgatggc  | cgcacagggt  | aaactgctcg  | agagcgcttg  | 1260 |
| cgggtggcgt  | atcgctcgtc  | tggaagaaaa  | agttaaaacc  | ctgaaagctc  | agaactccga  | 1320 |
| actggcttcc  | accgctaaca  | tgctgcgtga  | acagggttgct | cagctgaagc  | agaaagttat  | 1380 |
| gaaccacggc  | ggttgtgcta  | gcggtggcgg  | ctccggttcc  | gggtgattttg | attatgaaaa  | 1440 |
| aatggcaaac  | gctaataagg  | gggctatgac  | cgaaaatgcc  | gatgaaaacg  | cgctacagtc  | 1500 |
| tgacgctaaa  | ggcaaacttg  | attctgtcgc  | tactgattac  | gggtgctgcta | tcgatgggtt  | 1560 |
| cattgggtgac | gtttccggcc  | ttgctaattg  | taatgggtgct | actgggtgatt | ttgctggctc  | 1620 |
| taattcccaa  | atggctcaag  | tcgggtgacg  | tgataattca  | cctttaatga  | ataatttccg  | 1680 |
| tcaatatttta | ccttctttgc  | ctcagtcggg  | tgaatgtcgc  | ccttatgtct  | ttggcgctgg  | 1740 |
| taaaccatat  | gaattttcta  | ttgattgtga  | caaaataaac  | ttattccgtg  | gtgtctttgc  | 1800 |
| gtttctttta  | tatgttgcca  | cctttatgta  | tgtattttcg  | acgtttgcta  | acatactgcg  | 1860 |
| taataaggag  | tcttaataag  | cttgacctgt  | gaagtgaaaa  | atggcgacac  | ttgtgogaca  | 1920 |
| ttttttttgt  | ctgccgttta  | ccgctactgc  | gtcacggatc  | tccacgcgcc  | ctgtagcggc  | 1980 |
| gcattaagcg  | cggcggtgtg  | gggtggttac  | cgcagcgtga  | ccgctacact  | tgccagcgcc  | 2040 |
| ctagcgcgcc  | ctcctttcgc  | tttcttccct  | tctttctcgc  | ccacgttcgc  | cggctttccc  | 2100 |
| cgtcaagctc  | taaatcgggg  | gctcccttta  | gggttccgat  | ttagtgcctt  | acggcacctc  | 2160 |
| gaccccaaaa  | aacttgatta  | gggtgatggg  | tcacgtagt   | ggccatcgcc  | ctgatagacg  | 2220 |
| gtttttcgcc  | ctttgacgtt  | ggagtccacg  | ttctttaata  | gtggactctt  | gttccaaact  | 2280 |
| ggaacaacac  | tcaaccctat  | ctcgggtctat | tcttttgatt  | tataagggat  | tttgccgatt  | 2340 |
| tcggcctatt  | ggttaaaaaa  | tgagctgatt  | taacaaaaat  | ttaacgcgaa  | ttttaacaaa  | 2400 |
| atattaacgc  | ttacaatttc  | aggtggcact  | tttcggggaa  | atgtgcgcgg  | aaccctatt   | 2460 |
| tgtttatatt  | tctaaataca  | ttcaaataatg | tatccgctca  | tgagacaata  | accctgataa  | 2520 |
| atgcttcaat  | aatattgaaa  | aaggaagagt  | atgagtattc  | aacatttccg  | tgctcgccctt | 2580 |
| attccctttt  | ttgcggcatt  | ttgccttcct  | gtttttgctc  | acccagaaac  | gctggtgaaa  | 2640 |
| gtaaaagatg  | ctgaagatca  | gttgggtgca  | cgagtgggtt  | acatcgaact  | ggatctcaac  | 2700 |
| agcggtaaga  | tccttgagag  | ttttcgcccc  | gaagaacgtt  | ttccaatgat  | gagcaacttt  | 2760 |
| aaagtctctg  | tatgtggcgc  | ggtattatcc  | cgtattgacg  | ccgggcaaga  | gcaactcggt  | 2820 |
| cgcgcgcatc  | actatttcta  | gaatgacttg  | gttgagtact  | caccagtcac  | agaaaagcat  | 2880 |
| cttacggatg  | gcatgacagt  | aagagaatta  | tgacgtgctg  | ccataaccat  | gagtataaac  | 2940 |
| actgcgccca  | acttacttct  | gacaacgcac  | ggaggaccga  | aggagctaac  | cgcttttttg  | 3000 |
| cacaacatgg  | gggatcatgt  | aactcgcctt  | gatcggtggg  | aaccggagct  | gaatgaagcc  | 3060 |
| ataccaaacg  | acgagcgtga  | caccacgatg  | cctgtagcaa  | tggcaacaac  | gttgcgcaaa  | 3120 |
| ctattaactg  | gcgaactact  | tactctagct  | tcccggcaac  | aattgataga  | ctggatggag  | 3180 |
| gcggataaag  | ttgcaggacc  | acttctgcgc  | tcggcccttc  | cggctggctg  | gtttattgct  | 3240 |
| gataaatctg  | gagccgggtga | gcgtggctct  | cgcggtatca  | ttgcagcact  | ggggccagat  | 3300 |
| ggtaagccct  | cccgtatcgt  | agttatctac  | acgacgggga  | gtcaggcaac  | tatggatgaa  | 3360 |
| cgaatatagac | agatcgctga  | gatagggtgcc | tactgatta   | agcattggta  | ggaattaatg  | 3420 |
| atgtctcgtt  | tagataaaa   | taaagtgtat  | aacagcgcat  | tagagctgct  | taatgaggtc  | 3480 |
| ggaatcgaag  | gtttaacaac  | ccgtaaactc  | gcccagaagc  | taggtgtaga  | gcagcctaca  | 3540 |
| ttgtattggc  | atgtaaaaa   | taagcgggct  | ttgctcgacg  | ccttagccat  | tgagatgtta  | 3600 |
| gataggcacc  | atactcactt  | ttgcccttta  | gaaggggaaa  | gctggcaaga  | ttttttacgt  | 3660 |
| aataacgcta  | aaagttttag  | atgtgcttta  | ctaagtcac   | gcgatggagc  | aaaagtacat  | 3720 |
| tgccaacaag  | gtttttcact  | aaaacagtat  | gaaactctcg  | aaaatcaatt  | agccttttta  | 3780 |
| acttttaggtt | gcgtattgga  | agagaatgca  | ttatatgcac  | tcagcgcagt  | ggggcatttt  | 3840 |
| cctactactg  | atagtatgcc  | agatcaagag  | catcaagtcg  | ctaaagaaga  | aagggaacaa  | 3900 |
| ggtgcagagc  | cagccttctt  | gccattatta  | cgacaagcta  | tcgaattatt  | tgatcaccaa  | 3960 |
| cttaaatgtg  | aaagtgggtc  | attcggcctt  | gaattgatca  | tatgoggatt  | agaaaaacaa  | 4020 |
| tagtttaaaa  | ggatctaggt  | ttaaaagcag  | cataaccttt  | ttccgtgatg  | gtaacttcac  | 4080 |
| cgtgagtttt  | cgttccactg  | gaagatcctt  | tttgataatc  | tcatgaccaa  | aatcccttaa  | 4140 |
| gatccttttt  | ttctgcgcgt  | agcgtcagac  | cccgtagaaa  | agatcaaagg  | atcttcttga  | 4200 |
| gtgggtttgtt | tgccggatca  | aatctgctgc  | ttgcaaacaa  | aaaaaccacc  | gctaccagcg  | 4260 |
|             | agagctacca  | actctttttc  | cgaaggtaac  | tggttccagc  |             | 4320 |



```

agagcgcaga taccaaatac tgtccttcta gtgtagccgt agttaggcca ccacttcaag 4380
aactctgtag caccgcctac atacctcgct ctgctaatacc tgttaccagt ggctgctgcc 4440
agtggcgata agtcgtgtct tacccgggttg gactcaagac gatagttacc ggataaggcg 4500
cagcggtcgg gctgaacggg gggttcgtgc acacagccca gcttgaggcg aacgacctac 4560
accgaactga gatacctaca gcgtgagcta tgagaaagcg ccacgcttcc cgaagggaga 4620
aaggcggaca ggtatccggt aagcggcagg gtcggaacag gagagcgcac gagggagctt 4680
ccagggggaa acgcctggta tctttatagt cctgtcgggt ttcgccacct ctgacttgag 4740
cgtcgatttt tgtgatgctc gtcagggggg cggagcctat ggaaaaacgc cagcaacgcg 4800
gcctttttac ggttcctggc cttttgctgg ccttttgctc acatgaccgc acaccatcga 4860
atggccagat gattaattcc taatttttgt tgacactcta tcattgatag agttatttta 4920
ccactcccta tcagtgatag agaaaagtga aatgaatagt tcgacaaaaa t 4971

```

<210> 3  
 <211> 4765  
 <212> DNA  
 <213> künstliche Sequenz

<220>  
 <221> pCN1/GFP24 Klonierungs- und Expressionsvektor

<400> 3

```

ctagataaga aggaagaaaa ataatgaaca ataacgatct ctttcaggca tcacgtcggc 60
gttttctggc acaactcggc ggcttaaccg tcgccgggat gctggggccg tcattgttaa 120
cgccgcgacg tgcgactgcg gccagccgg ccatggcggg atccgttcaa ctagcagacc 180
attatcaaca aaatactcca attggcgatg gccctgtcct tttaccagac aaccattacc 240
tgtcgacaca atctgccctt tcgaaagatc ccaacgaaaa gcgtgaccac atggtccttc 300
ttgagtttgt aactgctgct gggatttccg gtgggtggtg tgctaccccg caggacctga 360
acaccatgct gggtagtggt ggtagtaaag gagaagaact tttcactgga gttgtcccaa 420
ttcttggtga attagatggt gatgttaatg ggcacaaaatt ttctgtcagt ggagagggtg 480
aaggtgatgc aacatacggg aaacttacc tttaaatttat ttgcactact ggaaaactac 540
ctgttccatg gccaacactt gtcactactt tctcttatgg tgttcaatgc ttttcccggt 600
atccggatca tatgaaacgg catgactttt tcaagagtgc catgcccga gggtatgtac 660
aggaacgcac tatactcttc aaagatgacg ggaactacaa gacgcgtgct gaagtcaagt 720
ttgaagggtga tacccttggt aatcgtatcg agttaaagg tattgatttt aaagaagatg 780
gaaacattct cggacacaaa ctcgagtaca actataactc acacaatgta tacatcacgg 840
cagacaaaaca aaagaatgga atcaaagcta acttcaaaat tcgccacaac attgaagatt 900
cggcctcggg ggccgcagaa caaaaactca tctcagaaga gaatctgtat ttccaggcg 960
atgcttgccg tggcaccgac accctgcaag ctgaaaccga ccagctggaa gacgagaaat 1020
ccgctctgca gactgaaatc gctaaccctg tgaagagaaa agagaaaactg gaattcattc 1080
tggtgctca cggcggttgt gggctaggct aataacttaa gccaggagg aaaataaaat 1140
gaaataccta ttgcctacgg cagccgctgg attgttatta ctgcgggcac agccggccat 1200
ggcaagcatc tgcgggtggc gtatcgctcg tctggaagaa aaagttaaaa cctgaaagc 1260
tcagaactcc gaactggctt ccaccgctaa catgctgcgt gaacagggtt ctcagatgaa 1320
gcagaaagtt atgaaccacg gcggttgtgg tggcggttcc ctacgaggct ccggttccgg 1380
tgattttgat tatgaaaaaa tggcaaacgc taataagggg gctatgaccg aaaatgccga 1440
tgaaaaacgc ctacagtctg acgctaaagg caaacttgat tctgtcgcta ctgattacgg 1500
tgctgctatc gatggtttca ttggtgacgt ttccggcctt gctaattgga atggtgctac 1560
tggtgatttt gctggctcta attcccaaat ggctcaagtc ggtgacggtg ataattcacc 1620
tttaataaat aatttccgtc aatatattacc ttctttgcct cagtccggtg aatgtcgccc 1680
ttatgtcttt ggcgctggta aaccatatga attttctatt gattgtgaca aaataaaact 1740
attccgtggt gtctttgcgt ttcttttata tgttgccacc tttatgtatg tattttcgac 1800
gtttgctaac atactgcgta ataaggagtc ttaataagct tgacctgtga agtgaataat 1860
ggcgacacatt gtgcgacatt ttttttgtct gccgtttacc gctactgcgt cacggatctc 1920
cagcgccct gtagcggcgc attaagcgcg gcgggtgtgg tggttacgcg cagcgtgacc 1980
gctacacttg ccagcgccct agcgcccgct cctttcgctt tcttcccttc ctttctcgcc 2040
acgttcgccg gctttccccc tcaagctcta aatcgggggc tccctttagg gttccgattt 2100
agtgttttac ggcacctcga ccccaaaaaa cttgattagg gtgatgggtc acgtagtggg 2160
ccatcgccct gatagacggg ttttcgccct ttgacgttgg agtccacgtt ctttaatagt 2220
ggactcttgt tccaaactgg aacaacactc aaccctatct cgggtctattc ttttgattta 2280
taagggattt tgccgatttc ggcctattgg ttaaaaaatg agctgattta acaaaaaatt 2340
aacgcgcatg caacgcttac aatttcaggt ggcacttttc ggggaaatgt gcgcggaacc 2400

```

```

cctattttgtt tatttttcta aatacattca aatatgtatc cgctcatgag acaataaacc 2460
tgataaatgc ttcaataata ttgaaaaagg aagagtatgg agaaaaaaat cactggatat 2520
accaccgttg atatatccca atggcatcgt aaagaacatt ttgaggcatt tcagtcagtt 2580
gctcaatgta cctataacca gaccgttcag ctggatatta cggccttttt aaagaccgta 2640
aagaaaaata agcacaagtt ttatccggcc tttattcaca ttcttgcccg cctgatgaat 2700
gctcatccgg aattccgtat ggcaatgaaa gacggtgagc tggatgatag ggatagtgtt 2760
cacccttgtt acaccgtttt ccatgagcaa actgaaacgt tttcatcgct ctggagtga 2820
taccacgacg atttccggca gtttctacac atatatcgc aagatgtggc gtgttacggt 2880
gaaaacctgg cctatttccc taaagggttt attgagaata tgtttttcgt ctacgccaat 2940
ccctgggtga gtttcaccag ttttgattta aacgtggcca atatggacaa cttcttcgcc 3000
cccgttttc ctatgggcaa atattatacg caaggcgaca aggtgctgat gccgctggcg 3060
attcaggttc atcatgccgt ttgtgatggc ttccatgtcg gcagaatgct taatgaatta 3120
caacagtact gcgatgagt gcagggcggg gcgtaatagg aattaatgat gtctcgttta 3180
gataaaagta aagtgattaa cagcgcatla gagctgctta atgaggtcgg aatcgaaggt 3240
ttaacaaccc gtaaaactcg ccagaagcta ggtgtagagc agcctacatt gtattggcat 3300
gtaaaaaata agcgggcttt gctcgacgcc ttagccattg agatgttaga taggcacccat 3360
actcactttt gccctttaga aggggaaagc tggcaagatt ttttacgtaa taacgctaaa 3420
agtttttagat gtgctttact aagtcacgc gatggagcaa aagtacattt aggtacacgg 3480
cctacagaaa aacagtatga aactctcgaa aatcaattag cttttttatg ccaacaaggt 3540
ttttcactag agaatgcatt atatgcactc agcgcagtgg ggcattttac tttagggttg 3600
gtattggaag atcaagagca cattattacg acaagctatc gaattatttg atcaccaagg tgcagagcca 3720
agtatgccgc cattattacg attgatcata tgcggattag aaaaacaact taaatgtgaa 3780
gccttcttat tcggccttga taaccttttt ccgtgatggg aacttacta ttaacgctcg 3840
agtgggtctt aaaagcagca aatattttgt taactagttt aaaaggatct aggtgaagat 3900
gttgccgccc ggcgtttttt ccaaaatccc ttaacgtgag ttttcgttcc actgagcgtc 3960
cctttttgat aatctcatga aaggatcttc ttgagatcct tttttctgc gcgtaatctg 4020
agaccccgta gaaaagatca caccgctacc agcggtggtt tgtttgccgg atcaagagct 4080
ctgcttgcaa acaaaaaaac taactggctt cagcagagcg cagataccaa atactgtcct 4140
accaactctt tttccgaagg gccaccactt caagaactct gtagcaccgc ctacatacct 4200
tctagtgtag ccgtagttag cagtggctgc tgccagtggc gataagtcgt gtcttaccgg 4260
cgctctgcta atcctgttac taccggataa ggccgacggc tcgggctgaa cgggggggtt 4320
gttgacacag cccagcttgg agcgaacgac ctacaccgaa ctgagatacc tacagcgtga 4380
gctatgagaa agcgcacgc gcacgagggg gacttccagg gacaggtatc cggtaagcgg 4440
caggggtcgg acaggagagc acctctgact tgagcgtcga tttttgtgat gctcgtcagg 4500
tagtctgtgc ggggttccgc ctatggaaaa acgccagcaa cgcggccttt ttacggttcc tggccttttg 4560
ctggcctttt gctcacatga cccgacacca tccgaatggc agatgattaa ttcctaattt 4620
ttgttgacac tctatcattg atagagttat tttaccactc cctatcagtg atagagaaaa 4680
gtgaaatgaa tagttcgaca aaaat

```

&lt;210&gt; 4

&lt;211&gt; 823

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; künstliche Sequenz

&lt;220&gt;

<221> reife TEM-1  $\beta$ -Lactamase Klonierungskassette

&lt;400&gt; 4

```

ggcccagccg gccatggctc acccagaaac gctgggtgaaa gtaaaagatg ctgaagatca 60
gttgggtgca cgagtgggtt acatcgaact ggatctcaac agcggtaaga tccttgagag 120
ttttcgcccc gaagaacgtt ttccaatgat gagcactttt aaagtctctg tatgtggcgc 280
ggattattcc cgtattgacg ccgggcaaga gcaactcggc cgccgcatac actatttctc 240
gaatgacttg gttgagtact caccagtcac agaaaagcat cttacggatg gcatgacagt 300
aagagaatta tgcagtgcgt ccataacctat gagtataaad actgcccggc acttacttct 360
gacaacgatc ggaggaccga aggagctaac cgcttttttg cacaacatgg gggatcatgt 420
aactcgcctt gatcggtggg aaccggagct gaatgaagcc ataccaaacg acgagcgtga 480
caccacgatg cctgtagcaa tggcaacaac gttgcgcaaa ctattaactg gcgaactact 540
tactctagct tcccggcaac aattgataga ctggatggag gcggataaag ttgcaggacc 600

```

```
acttctgcgc tcggcccttc cggctggctg gtttattgct gataaatctg gagccggtga 660
gcgtggctct cgcggtatca ttgcagcact ggggccagat ggtaagccct cccgtatcgt 720
agttatctac acgacgggga gtcaggcaac tatggatgaa cgaaatagac agatcgctga 780
gataggtgcc tcactgatta agcattggtc ggcctcgggg gcc 823
```

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/13709

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C12N15/10 C12N15/62 C12Q1/02 G01N33/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 C12N C12Q G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, CAB Data, SEQUENCE SEARCH, BIOSIS, EPO-Internal, MEDLINE

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
|------------|--|-----------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| A | WO 92/18619 A (SCRIPPS RESEARCH INST)<br>29 October 1992 (1992-10-29)<br>the whole document   |  |
| A | CRAMERI R ET AL: "DISPLAY OF BIOLOGICALLY<br>ACTIVE PROTEINS ON THE SURFACE OF<br>FILAMENTOUS PHAGES: A CDNA CLONING SYSTEM<br>FOR SELECTION OF FUNCTIONAL GENE PRODUCTS<br>LINKED TO THE GENETIC INFORMATION<br>RESPONSIBLE FOR THEIR PRODUCTION"<br>GENE, ELSEVIER BIOMEDICAL PRESS.<br>AMSTERDAM, NL,<br>vol. 137, 1993, pages 69-75, XP000982171<br>ISSN: 0378-1119<br>the whole document |  |

---  
-/-

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 April 2004

Date of mailing of the international search report

23/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hornig, H

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 03/13709

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| A          | WO 97/32017 A (GE LIMING ;ILAG VIC (DE);<br>MORPHOSYS PROTEINOPTIMIERUNG (DE))<br>4 September 1997 (1997-09-04)<br>the whole document  |                       |
| A          | WO 00/71694 A (SCRIPPS RESEARCH INST)<br>30 November 2000 (2000-11-30)<br>the whole document   |                       |
| A          | WO 02/22667 A (MUELLER JOERG PAUL ;BRON<br>SIERD (NL); DIJL JAN MAARTEN VAN (NL); JO)<br>21 March 2002 (2002-03-21)<br>the whole document  |                       |
| A          | DELISA M P ET AL: "Genetic analysis of<br>the twin arginine translocator secretion<br>pathway in bacteria"<br>JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMERICAN<br>SOCIETY OF BIOLOGICAL CHEMISTS, BALTIMORE,<br>MD, US,<br>vol. 277, no. 33,<br>16 August 2002 (2002-08-16), pages<br>29825-29831, XP002971647<br>ISSN: 0021-9258<br>cited in the application<br>the whole document |                       |
| A          | PASCHKE MATTHIAS ET AL: "New series of<br>vectors for phage display and prokaryotic<br>expression of proteins"<br>BIOTECHNIQUES,<br>vol. 30, no. 4, April 2001 (2001-04),<br>pages 720-726, XP002276383<br>ISSN: 0736-6205<br>cited in the application<br>the whole document   |                       |
| A          | DALBEY R E ET AL: "Protein translocation<br>into and across the bacterial plasma<br>membrane and the plant thylakoid membrane"<br>TIBS TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES,<br>ELSEVIER PUBLICATION, CAMBRIDGE, EN,<br>vol. 24, no. 1, January 1999 (1999-01),<br>pages 17-22, XP004155514<br>ISSN: 0968-0004<br>the whole document   |                       |

-/-

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 03/13709

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| A          | <p>SETTLES A M ET AL: "Old and new pathways of protein export in chloroplasts and bacteria."<br/>TRENDS IN CELL BIOLOGY. ENGLAND DEC 1998, vol. 8, no. 12, December 1998 (1998-12), pages 494-501, XP002276384<br/>ISSN: 0962-8924<br/>cited in the application<br/>the whole document</p> |                       |
| A          | <p>SAMUELSON J C ET AL: "YidC mediates membrane protein insertion in bacteria."<br/>NATURE. ENGLAND 10 AUG 2000, vol. 406, no. 6796, 10 August 2000 (2000-08-10), pages 637-641, XP002276385<br/>ISSN: 0028-0836<br/>cited in the application<br/>the whole document</p>                   |                       |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 03/13709

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| WO 9218619                                | A | 29-10-1992          | AU 662148 B2               | 24-08-1995          |
|   |   |                     | AU 1785692 A               | 17-11-1992          |
|   |   |                     | CA 2108147 A1              | 11-10-1992          |
|   |   |                     | EP 0580737 A1              | 02-02-1994          |
|   |   |                     | FI 934422 A                | 08-12-1993          |
|   |   |                     | IE 921169 A1               | 21-10-1992          |
|   |   |                     | JP 6506836 T               | 04-08-1994          |
|   |   |                     | JP 2003204797 A            | 22-07-2003          |
|   |   |                     | NO 933610 A                | 10-12-1993          |
|   |   |                     | PT 100379 A ,B             | 31-08-1993          |
|   |   |                     | WO 9218619 A1              | 29-10-1992          |
|   |   |                     | US 5658727 A               | 19-08-1997          |
|   |   |                     | US 2004002057 A1           | 01-01-2004          |
|   |   |                     | US 5759817 A               | 02-06-1998          |
|   |   |                     | US 5955341 A               | 21-09-1999          |
|   |   |                     | US 6468738 B1              | 22-10-2002          |
|   |   |                     | US 6235469 B1              | 22-05-2001          |
|   |   |                     | US 5667988 A               | 16-09-1997          |
|   |   |                     | US 6096551 A               | 01-08-2000          |
| WO 9732017                                | A | 04-09-1997          | CA 2244838 A1              | 04-09-1997          |
|   |   |                     | WO 9732017 A1              | 04-09-1997          |
|   |   |                     | EP 0883686 A1              | 16-12-1998          |
|   |   |                     | JP 2000505306 T            | 09-05-2000          |
| WO 0071694                                | A | 30-11-2000          | US 6472147 B1              | 29-10-2002          |
|   |   |                     | AU 5290000 A               | 12-12-2000          |
|   |   |                     | CA 2374505 A1              | 30-11-2000          |
|   |   |                     | EP 1185636 A1              | 13-03-2002          |
|   |   |                     | WO 0071694 A1              | 30-11-2000          |
|   |   |                     | US 2003186322 A1           | 02-10-2003          |
| WO 0222667                                | A | 21-03-2002          | AU 9274901 A               | 26-03-2002          |
|   |   |                     | EP 1356060 A2              | 29-10-2003          |
|   |   |                     | WO 0222667 A2              | 21-03-2002          |
|   |   |                     | US 2002110860 A1           | 15-08-2002          |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13709

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C12N15/10 C12N15/62 C12Q1/02 G01N33/68

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C12N C12Q G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, CAB Data, SEQUENCE SEARCH, BIOSIS, EPO-Internal, MEDLINE

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile  | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A          | WO 92/18619 A (SCRIPPS RESEARCH INST)<br>29. Oktober 1992 (1992-10-29)<br>das ganze Dokument  |                    |
| A          | CRAMERI R ET AL: "DISPLAY OF BIOLOGICALLY<br>ACTIVE PROTEINS ON THE SURFACE OF<br>FILAMENTOUS PHAGES: A CDNA CLONING SYSTEM<br>FOR SELECTION OF FUNCTIONAL GENE PRODUCTS<br>LINKED TO THE GENETIC INFORMATION<br>RESPONSIBLE FOR THEIR PRODUCTION"<br>GENE, ELSEVIER BIOMEDICAL PRESS.<br>AMSTERDAM, NL,<br>Bd. 137, 1993, Seiten 69-75, XP000982171<br>ISSN: 0378-1119<br>das ganze Dokument |                    |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. April 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

23/04/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hornig, H



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13709

| C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Kategorie°   | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile   | Betr. Anspruch Nr. |
| A  | WO 97/32017 A (GE LIMING ;ILAG VIC (DE); MORPHOSYS PROTEINOPTIMIERUNG (DE))<br>4. September 1997 (1997-09-04)<br>das ganze Dokument  |                    |
| A  | WO 00/71694 A (SCRIPPS RESEARCH INST)<br>30. November 2000 (2000-11-30)<br>das ganze Dokument  |                    |
| A  | WO 02/22667 A (MUELLER JOERG PAUL ;BRON SIERD (NL); DIJL JAN MAARTEN VAN (NL); JO)<br>21. März 2002 (2002-03-21)<br>das ganze Dokument   |                    |
| A  | DELISA M P ET AL: "Genetic analysis of the twin arginine translocator secretion pathway in bacteria"<br>JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMERICAN SOCIETY OF BIOLOGICAL CHEMISTS, BALTIMORE, MD, US,<br>Bd. 277, Nr. 33,<br>16. August 2002 (2002-08-16), Seiten 29825-29831, XP002971647<br>ISSN: 0021-9258<br>in der Anmeldung erwähnt<br>das ganze Dokument |                    |
| A  | PASCHKE MATTHIAS ET AL: "New series of vectors for phage display and prokaryotic expression of proteins"<br>BIOTECHNIQUES,<br>Bd. 30, Nr. 4, April 2001 (2001-04),<br>Seiten 720-726, XP002276383<br>ISSN: 0736-6205<br>in der Anmeldung erwähnt<br>das ganze Dokument   |                    |
| A  | DALBEY R E ET AL: "Protein translocation into and across the bacterial plasma membrane and the plant thylakoid membrane"<br>TIBS TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES, ELSEVIER PUBLICATION, CAMBRIDGE, EN,<br>Bd. 24, Nr. 1, Januar 1999 (1999-01),<br>Seiten 17-22, XP004155514<br>ISSN: 0968-0004<br>das ganze Dokument   |                    |
|  | -/-  |                    |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13709

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile   | Betr. Anspruch Nr. |
|-----------|--|--------------------|
| A         | <p>SETTLES A M ET AL: "Old and new pathways of protein export in chloroplasts and bacteria."<br/> TRENDS IN CELL BIOLOGY. ENGLAND DEC 1998, Bd. 8, Nr. 12, Dezember 1998 (1998-12), Seiten 494-501, XP002276384<br/> ISSN: 0962-8924<br/> in der Anmeldung erwähnt<br/> das ganze Dokument</p> |                    |
| A         | <p>SAMUELSON J C ET AL: "YidC mediates membrane protein insertion in bacteria."<br/> NATURE. ENGLAND 10 AUG 2000, Bd. 406, Nr. 6796, 10. August 2000 (2000-08-10), Seiten 637-641, XP002276385<br/> ISSN: 0028-0836<br/> in der Anmeldung erwähnt<br/> das ganze Dokument</p>                  |                    |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13709

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| WO 9218619 A                                       | 29-10-1992                    | AU 662148 B2                      | 24-08-1995                    |
|  |                               | AU 1785692 A                      | 17-11-1992                    |
|  |                               | CA 2108147 A1                     | 11-10-1992                    |
|  |                               | EP 0580737 A1                     | 02-02-1994                    |
|  |                               | FI 934422 A                       | 08-12-1993                    |
|  |                               | IE 921169 A1                      | 21-10-1992                    |
|  |                               | JP 6506836 T                      | 04-08-1994                    |
|  |                               | JP 2003204797 A                   | 22-07-2003                    |
|  |                               | NO 933610 A                       | 10-12-1993                    |
|  |                               | PT 100379 A ,B                    | 31-08-1993                    |
|  |                               | WO 9218619 A1                     | 29-10-1992                    |
|  |                               | US 5658727 A                      | 19-08-1997                    |
|  |                               | US 2004002057 A1                  | 01-01-2004                    |
|  |                               | US 5759817 A                      | 02-06-1998                    |
|  |                               | US 5955341 A                      | 21-09-1999                    |
|  |                               | US 6468738 B1                     | 22-10-2002                    |
|  |                               | US 6235469 B1                     | 22-05-2001                    |
|  |                               | US 5667988 A                      | 16-09-1997                    |
|  |                               | US 6096551 A                      | 01-08-2000                    |
| WO 9732017 A                                       | 04-09-1997                    | CA 2244838 A1                     | 04-09-1997                    |
|  |                               | WO 9732017 A1                     | 04-09-1997                    |
|  |                               | EP 0883686 A1                     | 16-12-1998                    |
|  |                               | JP 2000505306 T                   | 09-05-2000                    |
| WO 0071694 A                                       | 30-11-2000                    | US 6472147 B1                     | 29-10-2002                    |
|  |                               | AU 5290000 A                      | 12-12-2000                    |
|  |                               | CA 2374505 A1                     | 30-11-2000                    |
|  |                               | EP 1185636 A1                     | 13-03-2002                    |
|  |                               | WO 0071694 A1                     | 30-11-2000                    |
|  |                               | US 2003186322 A1                  | 02-10-2003                    |
| WO 0222667 A                                       | 21-03-2002                    | AU 9274901 A                      | 26-03-2002                    |
|  |                               | EP 1356060 A2                     | 29-10-2003                    |
|  |                               | WO 0222667 A2                     | 21-03-2002                    |
|  |                               | US 2002110860 A1                  | 15-08-2002                    |